

Инструкция по применению лекарства

Групповая принадлежность:

Гомеопатическое средство

Описание для торгового наименования:

Цель Т

Фармакологическое действие:

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает хондропротекторное, хондростимулирующее, метаболическое и анальгезирующее действие. Стимулирует регенерацию, нормализует обмен веществ в хряще, синовиальной мембране и жидкости. Способствует восстановлению пораженных костей и надкостницы, укрепляет связки и соединительную ткань.

Показания:

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, связочных структур (гонартроз, полиартроз, спондилоартроз, остеохондроз, плечелопаточный периартрит, хондропатия, тендопатия), метаболические остеопатии, последствия травм и переломов позвоночника, патогенетическая терапия синдрома поясничного и шейного отделов позвоночника (люмбосакральные расстройства, шейная мигрень), ревматические заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный полиартрит, синдром Рейтера).

Противопоказания:

гиперчувствительность.

Побочные действия:

артралгия (при внутрисуставных инъекциях), снимаемая противовоспалительной терапией или местными анестетиками; кожные аллергические реакции.

Применение и дозировка:

Раствор для инъекций: п/к, в/м, в/в, внутрисуставно, периартикулярно, паравертебрально (методом "волдыря") - по 1-2 мл 2 раза в неделю. При заболевании крупных суставов - по 4 мл за 1 инъекцию, в острых случаях - 2-4 мл ежедневно.

Таблетки: сублингвально, по 1 таблетке 3-5 раз в сутки.

Мазь: местно, осторожно втирают в кожу над пораженной областью утром и вечером, при необходимости - чаще (до 5 раз в сутки) или накладывают мазевую повязку.

Особые указания: для усиления терапевтического эффекта рекомендуется одновременное применение всех 3 форм препарата.

