

Элефлокс ®

Eleflox

Левифлоксацин (Levofloxacin)
Хинолоны и фторхинолоны

Форма выпуска

Табл. по 250 мг и 500 мг

Механизм действия и основные эффекты

Противомикробный препарат широкого спектра действия. Оказывает выраженное бактерицидное действие. Препарат ингибирует обе субъединицы ДНК-гиразы и топоизомеразу IV, разрушает клеточную стенку бактерий. Также активен против пневмококков и внутриклеточных патогенов.

Фармакокинетика

Благодаря чрезвычайно высокой биодоступности и легкому проникновению внутрь клетки Элефлокс достигает высоких концентраций в интерстициальной тканевой жидкости и внутри клеток. Препарат обычно назначается один раз в сутки. 87% Элефлокса выводится с мочой в активной форме, благодаря чему достигаются высокие концентрации в мочеполовых органах и предстательной железе. При нарушении функции печени не требуется коррекции дозы. Для пожилых пациентов не требуется изменения режима дозирования, кроме случаев низкого клиренса креатинина.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами:

- Инфекции дыхательных путей (обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония)
- Острый синусит
- Инфекции мочевыводящих путей, неосложнённые и осложнённые: (пиелонефрит, цистит, уретрит и др.)
- Простатит
- Инфекции кожных покровов и мягких тканей
- Септицемия и бактериемия, связанная с указанными выше показаниями
- Интраабдоминальная инфекция

Способ применения и дозы

- Синусит (воспаление придаточных пазух носа): по 500 мг 1 раз в день – 10-14 дней
- Обострение хронического бронхита: по 250 мг или по 500 мг 1 раз в день – 7-10 дней
- Внебольничная пневмония: по 500 мг 1-2 раза в день – 7-14 дней
- Неосложнённые инфекции мочевых путей: по 250 мг 1 раз в день – 3 дня
- Простатит: по 500 мг 1 раз в день – 28 дней
- Осложнённые инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит: по 250 мг 1 раз в день – 7-10 дней
- Инфекции кожи и мягких тканей: по 250 мг или по 500 мг 1-2 раза в день – 7-14 дней
- Септицемия / бактериемия: по 250 мг или по 500 мг 1-2 раза в день – 10-14 дней
- Интраабдоминальная инфекция: по 250 мг или по 500 мг 1 раз в день – 7-14 дней (в комбинации с антибактериальными препаратами, действующими на анаэробную флору)

Регистрационное удостоверение:

П № 016110/01 от 23.12.2004

