

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

**Фалиминт®**

**Регистрационный номер:** П N015546/01

**Торговое название препарата:** Фалиминт®

**Международное непатентованное название (МНН)**

**или группировочное название:** ацетиламинонитропропоксибензол.

**Лекарственная форма:** драже

### **Состав:**

В одном драже содержится:

*Ядро:* ацетиламинонитропропоксибензол – 16,600 мг; сахароза, желатин, жир твердый, тальк, коповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

*Оболочка:* ацетиламинонитропропоксибензол – 8,400 мг; сахароза, тальк, глюкозный сироп, симетикона эмульсия 30 %, парафин жидкий, парафин твердый.

**Описание:** Круглые, двояковыпуклые драже почти белого цвета с гладкой поверхностью, однородные по окраске.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое средство

**Код АТХ:** R02AA20

### **Фармакологические свойства**

Противокашлевое средство, оказывает анальгезирующее, антисептическое действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании создает чувство прохлады в полости рта и гортани. Не оказывает высушивающего действия на слизистые оболочки, не вызывает чувство онемения во рту.

### **Фармакокинетика**

Максимальная концентрация действующего вещества в плазме крови обнаруживается через  $1/2$  - 1 час после приема препарата. Вследствие высокой растворимости в липидах и низкой растворимости в воде, ацетиламинонитропропоксибензол выводится из организма с мочой в метаболизированном виде. Концентрация метаболитов достигает своего максимального значения в моче через 2 часа. В течение 6 часов основное количество метаболитов элиминируется. По истечении 24 часов в моче в виде метаболитов обнаруживают около 95% от введенной дозы, в пересчете на основной метаболит – (3-(2-ацетамино-4-нитро-фенокси)пропионовая кислота).

### **Показания к применению**

- воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит);
- воспалительные заболевания полости рта (гингивит, стоматит);
- рефлекторный кашель (непродуктивный, раздражающий);
- подготовка к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов.

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к компонентам препарата,
- беременность,
- период лактации,
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция,
- детский возраст до 5 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В связи с отсутствием достаточного опыта применения во время беременности и в период лактации применять препарат не рекомендуется.

### **Способ применения и дозы**

Драже следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Рекомендуется взрослым и детям с 5 лет каждые 2-3 часа рассасывать по 1 драже препарата, не разжевывая.

Максимальная суточная доза 10 драже.

Препарат не предназначен для длительного применения. Не рекомендуется применять препарат более 5 дней без консультации врача.

### **Побочное действие**

*Редко:* аллергические реакции.

### **Передозировка**

Случаи интоксикации, вызванные препаратом Фалиминт<sup>®</sup>, не известны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не известны.

### **Особые указания**

Не использовать для длительного применения. После применения следует воздержаться от приема пищи и жидкости, во избежание снижения терапевтического эффекта.

Больным сахарным диабетом следует учитывать содержание сахара в препарате (1 драже соответствует 0,03 хлебной единицы).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не известно.

### **Форма выпуска**

Драже 25 мг.

По 20 драже в блистер из ПВХ / алюмин. фольга.

По 1 блистеру в картонную пачку с инструкцией по применению.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

5 лет

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

ЗАО «Берлин-Фарма»

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ "Башня на Набережной", Блок Б

**Фирма-производитель**

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg, 125

12489 Berlin, Germany

Берлин-Хеми АГ

Глиникер Вег, 125

12489 Берлин, Германия

**При фасовке и упаковке на ЗАО «ЗиО-Здоровье»:**

**Расфасовано и упаковано:**

ЗАО «ЗиО-Здоровье»

Россия, 142103, Московская область,

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2,

**Адрес для предъявления претензий:**

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ "Башня на Набережной", Блок Б