

Групповая принадлежность:

Иммуномодулирующее средство

Описание для торгового наименования: Флогэнзим

Лекарственная форма:

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Фармакологическое действие:

Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное действие, снижает выраженность местных экссудативных проявлений, уменьшая боль. Обладает фибринолитической, ангиопротекторной, иммуностимулирующей активностью, улучшает микроциркуляцию. Бромелин и трипсин способствуют быстрому расщеплению метаболических продуктов воспалительного процесса, рутин восстанавливает проницаемость стенок сосудов, что приводит к уменьшению отеков и гематом.

Снижает концентрацию тромбксана и агрегацию тромбоцитов, регулирует адгезию клеток крови, повышает эластичность мембран эритроцитов, восстанавливает число нормальных дискоцитов, уменьшает количество активных форм тромбоцитов, нормализует вязкость крови, снижает общее количество микроагрегатов, что способствует улучшению микроциркуляции и реологических свойств крови, предотвращает образование тромбов в сосудах. Уменьшает инфильтрацию интерстиция плазматическими клетками. Повышает элиминацию воспалительного детрита, ускоряет лизис уже образовавшихся тромбов, токсичных продуктов обмена веществ в зоне воспаления и некротизированных тканей.

Показания:

Комплексная терапия заболеваний:

ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), ревматизм мягких тканей, реактивные артриты, остеоартроз в стадии обострения, рассеянный склероз, переломы, вывихи, ушибы, разрывы и растяжение связок, ожоги;

острые тромбозы и тромбозы поверхностных вен, посттромбофлебитическая болезнь, эндартериит и облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, профилактика и лечение рецидивирующих флебитов;

ИБС, состояние после инфаркта миокарда (для улучшения реологических свойств крови);

цистит, уретрит, цистопиелит, простатит, аднексит, сальпингофорит, мастопатия, осложнения климактерического периода, для снижения частоты и выраженности осложнений заместительной гормональной терапии;

воспалительные заболевания органов пищеварительной системы: стоматит, острый гепатит, обострение хронического гепатита;

послеоперационные состояния (воспаление, тромбозы и отеки), профилактика спаечной болезни, профилактика и лечение послеоперационных лимфатических отеков;

воспалительные заболевания придаточных пазух носа.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, тяжелая гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия). С осторожностью. Беременность.

Побочные действия:

Аллергические реакции (кожная сыпь); редко - метеоризм, учащение стула, изменение консистенции, цвета и запаха кала.

Применение и дозировка:

Внутрь, по 2-4 таблетки (в зависимости от тяжести заболевания) 3 раза в сутки; при необходимости - 12 таблеток в сутки, за 30-60 мин до еды, запивают большим количеством жидкости (не менее 150 мл).

С целью повышения эффективности антибиотиков следует применять на протяжении всего курса антибиотикотерапии по 3 таблетки 3 раза в день.

Особые указания:

При инфекционных воспалительных заболеваниях не заменяет лечения антибиотиками, но повышает их эффективность.

Беременность и период лактации не являются противопоказанием для применения препарата, однако беременные женщины должны применять только под контролем врача.

Следует иметь в виду, что в самом начале приема препарата симптомы заболевания могут обостряться, в таких случаях лечение прерывать не следует, а рекомендуется временное снижение дозы.

Не оказывает негативного влияния на вождение автомобиля и выполнение работ, требующих высокой скорости психических и физических реакций.

Большие дозы препарата могут вызвать временное ощущение переполненности желудка. Для предотвращения этого явления рекомендуется разделить дневную дозу на большее количество разовых доз.

Взаимодействие:

Уменьшает побочные эффекты гормональных ЛС.

Повышает эффект антибиотиков и снижает побочные эффекты антибиотикотерапии.