

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ГЕДЕЛИКС®

(Hedelix)

Регистрационный номер: П N012391/01-190209

Торговое название препарата: Геделикс®

Лекарственная форма: Капли для приема внутрь

Состав (на 100 мл препарата):

Активное вещество:

Экстракт из листьев плюща (2,2-2,9:1) - 4,0 г

Вспомогательные вещества:

Пропиленгликоль - 83,690 г

Глицерол - 20,000 г

Ароматизатор - 0,130 г

Мятное масло водорастворимое - 0,030 г

1 мл (31 капля)

Описание

Прозрачная жидкость коричневатого цвета с ароматным запахом. После длительного хранения может образовываться осадок на дне, при взбалтывании вызывающий помутнение жидкости.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ R05CA

Фармакологическое действие

Препарат растительного происхождения, обладает отхаркивающим, муколитическим и спазмолитическим действием, обусловленным наличием сапонинов.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов с трудно отделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к мятному маслу.

Бронхиальная астма. Предрасположенность к ларингоспазму.

Недостаточность аргининсукцинат-синтазы.

Не следует применять для лечения грудных детей и детей до 2-х лет (в связи с возможностью возникновения ларингоспазма).

Применение во время беременности и кормления грудью

Геделикс® капли не следует применять при беременности и в период кормления грудью (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другой дозировки, Геделикс® следует принимать внутрь 3 раза в день после еды:

	разовая доза	суточная доза
Взрослые и дети старше 10 лет	31 капля	93 капли

Дети от 4-10 лет 21 капля 63 капли

Дети от 2 -4 лет 16 капель 48 капель

Препарат следует принимать неразбавленным и запивать достаточным количеством воды (до 1 стакана воды).

Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, в редких случаях - боли в эпигастральной области.

Передозировка

Симптомы: возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит, что объясняется содержанием в препарате сапонинов.

Лечение: отмена препарата; лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

В случае если улучшение состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Указания для больных сахарным диабетом:

Поскольку Геделикс® капли не содержит этанола и сахара, его могут применять больные сахарным диабетом.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 50 мл во флакон-капельницу темного стекла. Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Срок хранения после вскрытия первичной упаковки 6 месяцев.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2

D-53783 Айторф Германия

Представительство в России:

Россия 119049 г. Москва, Ленинский пр-т, д.2