

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ГЕДЕЛИКС®

(Hedelix)

Регистрационный номер: П N012391/02-190209

Торговое название препарата: Геделикс®

Лекарственная форма: Сироп

Состав (на 100 мл препарата):

Активное вещество:

Экстракт из листьев плюща (2,2-2,9:1) - 0,800 г

Вспомогательные вещества:

Макрогола глицерилгидроксистеарат - 0,500 г

Анисовое масло - 0,015 г

Гидроксиэтилцеллюлоза - 0,150 г

Сорбитола раствор 70% (некристаллизующийся) - 50,000 г

Пропиленгликоль - 13,877 г

Глицерол - 10,000 г

Вода очищенная - 39,968 г

Описание

Густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета своеобразного запаха: возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество и действие препарата.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения
Код АТХ R05CA

Фармакологическое действие

Препарат растительного происхождения, обладает отхаркивающим, муколитическим и спазмолитическим действием, обусловленным наличием сапонинов.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов с трудно отделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Геделикс® сироп нельзя принимать при наследственной непереносимости фруктозы, недостаточности аргининсукцинат-синтазы.

Применение во время беременности и кормления грудью

Геделикс® сироп не следует применять при беременности и в период кормления грудью (в связи с недостаточностью клинических данных).

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другой дозировки, Геделикс® следует принимать внутрь (после еды):

	разовая доза	суточная доза
Взрослые и дети старше 10 лет 3 раза в день	5 мл	15 мл

Дети от 4-10 лет 4 раза в день	2,5 мл	10 мл
Дети от 1 -4 лет 3 раза в день	2,5 мл	7,5 мл
Дети от 0-1 года 1 раз в день	2,5 мл	2,5 мл

В упаковке находится мерная ложечка. 1 мерная ложечка соответствует 5 мл и имеет метки «1/4», «1/2», «3/4», которые соответствуют 1,25 мл, 2,50 мл и 3,75 мл.

Взрослым и подросткам Геделикс® рекомендуется принимать неразбавленным. Грудным и маленьким детям Геделикс® рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды. Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания, но должна составлять не менее 7 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 2-3 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, в редких случаях - боли в эпигастральной области.

Передозировка

Симптомы: возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит, что объясняется содержанием в препарате сапонинов.

Лечение: отмена препарата; лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

В случае, если улучшение состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Указания для больных сахарным диабетом:

Поскольку Геделикс® не содержит сахара, его могут применять больные сахарным диабетом. 1 мерная ложечка (=5 мл) содержит 1,75 сорбитола, что соответствует 0,15 ХЕ.

Форма выпуска

Сироп. По 100 мл во флакон-капельницу темного стекла вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой из полипропилена с делениями помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года

Не применять по истечении срока годности.

Срок хранения после вскрытия первичной упаковки 6 месяцев.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2

53783 Айторф Германия

Представительство в России:

Россия 119049 г. Москва, Ленинский пр-т, д.2