

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ИЗОФРА

Регистрационный номер:
Торговое название: ИЗОФРА
МНН: фрамицетин

Лекарственная форма: спрей назальный

СОСТАВ: на 100 мл

Активное вещество:

Фрамицетина сульфат... 1, 25 г

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), натрия хлорид, натрия цитрат, лимонная кислота, вода дистиллированная

ОПИСАНИЕ: прозрачная бесцветная жидкость

Код АТХ: [K01AX08]

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антибиотик из группы аминогликозидов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в отоларингологии. Действует бактерицидно. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*), вызывающих развитие инфекционных процессов в верхних отделах дыхательных путей..

ПОКАЗАНИЯ:

В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в т.ч.:

- риниты;
- ринофарингиты;
- синуситы (при отсутствии повреждений перегородок).
- профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов. Препарат не следует применять для промывания придаточных пазух носа. Беременность и период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Взрослым: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 раз в сутки.

Детям: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки.

Длительность лечения - не более 7 дней.

При употреблении флакон следует держать в вертикальном положении.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Возможны аллергические реакции.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами

не выявлено.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Следует помнить, что при лечении возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Назальный спрей.

Светонепроницаемый полиэтиленовый флакон емкостью 15 мл с распыляющим наконечником и полиэтиленовой завинчивающейся крышкой в картонной коробке.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Список Б.

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

По рецепту врача..