

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Кипферон®

суппозитории для вагинального или ректального введения

«Кипферон®», суппозитории для вагинального или ректального введения - комбинированный препарат, в состав которого входят иммуноглобулиновый комплексный препарат для энтерального применения сухой (КИП), интерферон человеческий ре-комбинантный альфа-2, являющиеся активными веществами, и кондитерский жир (или масло какао), парафин, эмульгатор и вода очищенная, используемые в качестве вспомогательных веществ. КИП представляет собой лиофилизированный белковый раствор содержащий иммуноглобулины (Ig) классов G, M, A в следующем соотношении: IgG - 50%-70%, IgM - 15%-25%, IgA - 15%-25%.

В 1 суппозитории содержится не менее 500000 МЕ интерферона человеческого рекомбинантного альфа-2 и 60 мг КИП.

Суппозитории имеют конусообразную или цилиндрическую форму с заостренным концом, желтовато-белого или светло-бежевого цвета, однородной консистенции, без постороннего запаха (или со слабым ароматным запахом какао). Допускается неоднородность окраски в виде мраморности.

Иммунобиологические свойства

Препарат «Кипферон®», суппозитории для вагинального или ректального введения обладает выраженной противовирусной, антибактериальной и антихламидийной активностью, проявляет иммуномодулирующие и противовоспалительные свойства. Комплексный состав и способ применения препарата обуславливают ряд терапевтических эффектов: повышается местная и общая сопротивляемость организма происходит элиминация возбудителя и активизируются механизмы защиты в местах проникновения патогенов, снижаются проявления вирусной и микробной интоксикации, при эрозиях шейки матки обеспечивается стимуляция репаративных процессов в ее тканях «Кипферон®» препятствует углублению нарушенного равновесия аутофлоры (дисбиоза) и избыточному росту условно-патогенных микроорганизмов при заболеваниях. Побочные явления, возникающие при парентеральном введении препаратов интерферона (повышение температуры, гриппоподобные явления, лихорадка) при вагинальном или ректальном введении «Кипферона®» отсутствуют.

Показания к применению

«Кипферон®», суппозитории для вагинального или ректального введения применяют при лечении острых респираторных заболеваний, воспалительных заболеваний ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при острых вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника различного происхождения у детей; при лечении урогенитального хламидиоза у женщин, в том числе с проявлениями дисбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервицита шейки матки, эрозии шейки матки. Применение препарата осуществляют и на фоне общепринятой специфической терапии.

Способ применения и дозировка

При острых респираторных заболеваниях, воспалительных заболеваниях ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях у детей, дисбактериозе кишечника различного происхождения суппозитории назначают из расчета содержания в них рекомбинантного альфа-2-интерферона 500000 МЕ и 60 мг КИП на суппозиторий. Суточная доза составляет 1-3 суппозитория в зависимости от возраста больных: на первом году ректально 1 суппозиторий в сутки (в 1 приём), с 1 до 3-х лет - по 1 суппозиторию два раза в день, после 3-х лет - по 1 суппозиторию три раза в день в течение 5-7 дней. У больных ангиной с выраженным

гнойным процессом следует курс лечения продлить до 7-8 дней. Суппозитории применяют ректально без специфической терапии или одновременно с ней.

При лечении урогенитального хламидиоза у женщин суппозитории вводят глубоко интравагинально (до контакта с задним сводом влагалища и шейкой матки) по 1-2, в зависимости от выраженности заболевания, два раза в день. Курс лечения составляет в среднем 10 дней; при наличии эрозии шейки матки применение препарата продолжают до её эпителизации. По показаниям курс лечения может быть повторён. Лечение следует начинать в первые дни после окончания менструации. Перед введением рекомендуется удалить слизь со слизистых оболочек влагалища и шейки матки.

Реакция на введение

Побочных реакций не зарегистрировано.

Противопоказания к применению

Не установлено.

Форма выпуска

По 5 или 10 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке картонной с инструкцией по применению.

Срок годности, условия хранения и транспортирования.

Срок годности 1 год.

Суппозитории с истёкшим сроком годности применению не подлежат. Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2°C до 8°C. Хранить в сухом тёмном, недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 8°C.

Условия отпуска из аптек.

Отпускать без рецепта врача.