

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

# **МУКАЛТИН**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название МУКАЛТИН**

**Лекарственная форма** Таблетки

**Состав на 1 таблетку**

Мукалтина 0,05 г

Вспомогательных веществ до получения таблетки массой 0,3 г (натрия гидрокарбонат, кислота винная, кальция стеарат).

### **Описание**

Таблетки от светло-серого до коричневатого-серого цвета с вкраплениями или мраморностью, со специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Допускается неоднородность окрашивания поверхности таблеток.

### **Фармакологическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

### **Фармакологические свойства:**

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

### **Показания к применению:**

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь по 1-2 таблетки перед едой 3 раза в сутки. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

### **Побочные действия:**

Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Форма выпуска**

Таблетки по 0,05 г;

по 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке;

по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке;  
по 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 таблеток в банке полимерной.

Банки полимерные или контурные упаковки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Каждую банку или 1, 2, 3, 4, 5 контурных безъячейковых или ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

**Условия хранения.**

В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 20 °С.

**Срок годности**

2 года

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

ОАО «Уралбиофарм» 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А