

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по медицинскому применению препарата**

# **ОТРИВИН®**

**Регистрационный номер:** П №011649/05

**Торговое название:** Отривин® / Otrivin®

**Международное непатентованное название:** ксилометазолин

**Химическое название:** 2-[4-(1,1-Диметилэтил)-2,6-диметилбензил]-4,5-дигидро-1H-имидазола гидрохлорид

**Лекарственная форма** СПРЕЙ назальный ДОЗИРОВАННЫЙ [с ментолом и эвкалиптом].

**Состав** 1 мл препарата содержит: *Действующее вещество:* ксилометазолина гидрохлорид 1 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, 50% раствор (в пересчете на бензалкония хлорид), сорбитол 70%, динатрия эдетат, левоментол (ментол), цинеол (эвкалиптол), макрогола глицерилгидроксистеарат, вода очищенная.

### **Описание**

Белая опалесцирующая жидкость с запахом ментола и эвкалипта.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Противоконгестивное средство – альфа адреномиметик.

Код АТХ: R01AA07

### **Фармакологические свойства**

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с  $\alpha$ -адреномиметическим действием:

- вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя отек и гиперемию слизистой оболочки носа и носоглотки.
- освобождает носовое дыхание при ринитах.

Отривин® хорошо переносится пациентами даже с чувствительной слизистой оболочкой, его воздействие не препятствует отделению слизи. Более того, Отривин® имеет сбалансированный pH, характерный для полости носа. Содержащиеся в препарате ментол и эвкалиптол оказывают охлаждающее действие на слизистую оболочку носа, дающее ощущение свежести.

В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемии. Фармакологическое действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 12 часов.

### **Фармакокинетика**

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме крови настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка)
- острый аллергический ринит
- поллиноз
- синусит
- евстахиит
- средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).
- подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе). Детский возраст – до 6 лет.

С осторожностью: сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы; при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся симптомами бессонницы, головокружения, сердечной аритмии, тремора, повышенного кровяного давления.

## **Применение во время беременности и лактации**

В период беременности и лактации препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

## **Способ применения и дозы**

ИНТРАНАЗАЛЬНО.

Взрослые и дети старше 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить), обычно бывает достаточно 3-4 впрыскиваний в сутки.

## **Побочное действие**

При частом и/или длительном применении – раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чихание, гиперсекреция, тошнота.

Редко – отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, повышение артериального давления, головная боль, рвота, бессонница; тахикардия, аритмия, нечеткость зрения, системные аллергические реакции; депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

## **Передозировка**

Симптомы: усиление побочных эффектов, в частности – учащение пульса, повышение артериального давления, иногда может наблюдаться спутанность сознания. Лечение симптоматическое.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Несовместим с ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами.

## **Особые указания**

Не рекомендуется применять в непрерывном режиме более 10 дней. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей.

### **Влияние на работу с механизмами и способность управлять транспортными средствами**

Ксилометазолин не влияет на способность управлять транспортными средствами или оборудованием.

### **Форма выпуска**

Спрей назальный дозированный [с ментолом и эвкалиптом] 0,1%.

По 10 мл препарата во флаконе из полиэтилена высокой плотности, снабженном помповым дозирующим устройством с наконечником и с защитным колпачком из полиэтилена. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2,5 года. Не использовать после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

БЕЗ РЕЦЕПТА.

### **Название и адрес фирмы-производителя**

Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария Адрес: Рю де Летраз, п/я 269, 1260 Нион, Швейцария.  
Novartis Consumer Health SA, Switzerland. Route de l'Etraz, Case postale 269, 1260 Nyon, Switzerland