

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**РИНОНОРМ**

**Регистрационный номер:** П NO 14799/02-240409

**Торговое название:** Ринонорм

**Международное непатентованное название (МНН):** Ксилометазолин

**Лекарственная форма:** спрей назальный дозированный [для детей]

**Состав:**

10 мл спрея содержат:

*Активное вещество:*

Ксилометазолина гидрохлорид 5,0 мг

*Вспомогательные вещества:*

Лимонная кислота моногидрат, натрия цитрат дигидрат, глицерол 85 %, вода для инъекций.

**Описание**

Прозрачный бесцветный раствор.

**Фармакологическая группа:** антиконгестивное средство - альфа-адреномиметик.

**Код АТХ:** R01AA07

**Фармакологическое действие:**

Ксилометазолин является альфа-адреномиметиком, используемым для местного применения в ЛОР-практике.

При местном применении ксилометазолин вызывает сужение артериол, что приводит к уменьшению гиперемии и отека слизистых оболочек носоглотки и уменьшению отделяемого секрета. Отчетливое местное действие препарата выявляется уже через несколько минут и сохраняется в течение нескольких часов (до 6-8 часов), проявляясь в восстановлении проходимости носовых ходов, отверстий пазух и евстахиевых труб. Восстановление воздушной проходимости носоглотки улучшает самочувствие больных и снижает опасность возможных осложнений, вызванных застоем слизистого секрета.

*Фармакокинетика:*

При местном применении ксилометазолин практически не абсорбируется, поэтому концентрации в плазме крови очень малы (аналитически не определяются).

**Показания к применению:**

В качестве симптоматического лечения при следующих заболеваниях и состояниях:

- острый вирусный или бактериальный ринит;
- острый аллергический ринит;
- острый синусит или обострение хронического синусита;
- острый средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки евстахиевой трубы);
- подготовка больных к диагностическим процедурам в носовых ходах.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к ксилометазолину или другим компонентам препарата;
- воспаление кожи, слизистой оболочки носа и образование корки (сухой ринит);
- применение после гипофизэктомии;
- применение у детей до 2 лет;
- закрытоугольная глаукома;
- прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и трициклических антидепрессантов.

**С осторожностью:**

Применять с осторожностью у пациентов с артериальной гипертензией, тяжелыми сердечными заболеваниями, гипертиреозом и сахарным диабетом.

**Способ применения и дозы:**

Детям от 2-х до 10 лет:

по 1 дозе (одно нажатие на поршневое устройство) в каждый носовой ход не более 3-х раз в день (максимальная доза не должна превышать 7 раз в день). Интервал между введением препарата не должен быть менее 6 часов.

1 доза = 0,14 мл раствора.

Во избежание осложнений в виде возобновления симптомов заболевания, продолжительность непрерывного применения препарата не должна превышать 7 дней.

Перед применением Риноорма рекомендуется освободить носовой ход от секрета, а во время введения препарата необходимо сделать легкий вдох через нос. Для применения у взрослых и детей старше 10 лет следует использовать **Риноорм, спрей назальный дозированный**.

**Побочное действие:**

Ощущение жжения и сухости слизистой оболочки полости носа;

в редких случаях - раздражение слизистой оболочки носа, ротовой полости и гортани, головная боль и тошнота;

крайне редко (< 1/10000) - аритмия, увеличение артериального давления, повышенная возбудимость, кожные реакции.

**Передозировка:**

В редких случаях передозировки, возникающих преимущественно у детей, могут наблюдаться следующие симптомы: нерегулярный пульс, повышение артериального давления, в некоторых случаях - потеря сознания. При передозировке показано симптоматическое лечение под наблюдением.

В серьезных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения артериального давления, а также интубация и искусственная вентиляция лёгких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. При случайном приёме умеренного или большого количества препарата внутрь, следует принять активированный уголь (адсорбент) и натрия сульфат (слабительное средство), сделать промывание желудка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременный прием три- или тетрациклических антидепрессантов может увеличить системное воздействие ксилометазолина. При одновременном приеме препарата с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) возможен риск повышения артериального давления.

**Особые указания:**

Влияния на способность вождения транспорта и на управление машинами и механизмами не отмечено.

**Форма выпуска:**

Спрей назальный дозированный [для детей] 0,05 %,

По 10 мл или 15 мл во флакон темного стекла с дозирующим устройством для распыления, насадкой для носа и защитным колпачком.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25 С Хранить в недоступном для детей месте!

**СРОК ГОДНОСТИ:**

3 года, после вскрытия флакона - 1 год.

Не применять после истечения срока годности!

**Условия отпуска из аптек:**

Отпускается без рецепта.

**Производитель:**

«Меркле ГмбХ», Людвиг-Меркле штрассе 3, D-89143, г. Блаубойрен, Германия.

**В случае необходимости претензии потребителей направлять в адрес представительства фирмы в РФ:  
ООО «ратиофарм РУС», 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 9 (ДЦ СИТИДЕЛ)**