

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по медицинскому применению препарата**

### **Синупрет®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Синупрет®

**Лекарственная форма:**

Капли для приёма внутрь.

#### **Состав**

100 г капель Синупрет® содержат 29 г водно-спиртового экстракта из смеси следующих видов лекарственного растительного сырья:

*Активные компоненты:*

горечавки корень ( <i>Gentiana lutea</i> )	0,2 г
первоцвета цветки ( <i>Primula veris</i> )	0,6 г
щавеля трава ( <i>Rumex acetosa</i> )	0,6 г
бузины цветки ( <i>Sambucus nigra</i> )	0,6 г
вербены трава ( <i>Verbena officinalis</i> )	0,6 г

Содержание этанола: 16,0 - 19,0 % (о/о)

*Вспомогательные вещества:* Очищенная вода 71,0 г

#### **Описание**

Прозрачная, желтовато-коричневая жидкость с ароматным запахом. Возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Средство лечения заболеваний носа растительного происхождения

**Код АТХ:** R07AX

#### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Фармакологические свойства обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Синупрет® оказывает секретолитическое, секретомоторное, противовоспалительное действие. Способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей.

#### **Показания к применению**

Острые и хронические синуситы, сопровождающиеся образованием вязкого секрета.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкоголизм, детский возраст (до 2 лет).

Не следует принимать препарат пациентам после успешного антиалкогольного лечения

**С осторожностью:** заболевания печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

### **Применение при беременности и лактации**

Применение Синупрета® в период беременности возможно только по назначению врача; принимать капли Синупрет, вследствие содержания алкоголя, следует только в том случае, если не возможен прием драже Синупрет®.

Препарат не рекомендуется принимать в период кормления грудью (в связи с отсутствием опыта его клинического применения).

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды.

*Взрослым:* по 50 капель 3 раза в день

*Детям школьного возраста:* по 25 капель 3 раза в день

*Детям от 2 до 6 лет:* по 15 капель 3 раза в день

Курс лечения составляет 7-14 дней.

Если симптомы сохраняются более 7-14 дней или повторяются периодически, то необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, ангионевротический отек, одышка). В очень редких случаях возможно появление боли в верхней части живота, тошноты. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Прием препарата в дозах, значительно превышающих терапевтические, может вызвать отравление алкоголем. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. При приеме содержимого целого флакона (100 мл) в организм попадает 16 г этилового спирта.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известно.

### **Особые указания**

В составе препарата содержится 16,0-19,0% этанола (в объемном отношении).

При использовании флакон следует держать в вертикальном положении.

В процессе хранения капель Синупрет® возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами, требующими повышенного внимания. Перед употреблением взбалтывать!

### **Форма выпуска**

Капли для приема внутрь. По 100 мл препарата во флакон темного стекла с дозирующим капельным устройством сверху, с навинчивающейся крышкой и с предохранительным кольцом, вместе с инструкцией помещается в складную картонную коробку.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Открытые флаконы можно использовать в течение 6 месяцев.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель Бионорика АГ**

D-92318 Ноймаркт/Германия Кершенштайнерштрассе 11-15

92318 Ноймаркт Германия

**Представительство в Москве**

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 105, корп.2