

# **ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата**

## **ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Таблетки от кашля

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав (на 1 таблетку):**

*Активные компоненты:* Термопсиса ланцетного травы порошок - 0,0067 г Натрия гидрокарбоната - 0,250 г

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, тальк.

**Описание:** Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской зеленовато-серого цвета.  
Допускается наличие темных вкраплений.

**Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код ATХ:** [R05CA10]

**Фармакологические свойства**

Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез.

Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, ана-гирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотный центры.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

**Показания к применению**

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) - в составе комплексной терапии.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

**Способ применения и дозы**

Внутрь взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет - по 1/2 - 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Длительность лечения по рекомендации врача.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции; при приеме больших доз - рвота.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание мокроты.

**Особые указания**

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое

питье.

**Форма выпуска**

Таблетки.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. Контурные безъячейковые упаковки вместе с инструкциями по применению помещают в групповую упаковку.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности 4 года.**

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Отпуск из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

ОАО "Дальхимфарм ", 680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.