

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**(информация для специалистов)**  
**по медицинскому применению препарата**

**ТЕРПИНКОД®**

Регистрационное удостоверение 001144/01-041207

Торговое название препарата Терпинкод®

МНИ или группировочное название Кодеин+Терпингидрат+Натрия гидрокарбонат

Лекарственная форма таблетки

**Состав**

*Активные вещества:*

кодеин 8 мг, терпингидрат 250 мг, натрия гидрокарбонат 250 мг.

*Вспомогательные вещества:*

крахмал картофельный, кислота стеариновая, тальк.

**Описание**

таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской. Допускается незначительная мраморность.

**Фармакотерапевтическая группа**

противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство + отхаркивающее средство).

Код АТХ [R05FA02]

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат. Кодеин - противокашлевое средство центрального действия; алкалоид фенантренового ряда. Агонист опиоидных рецепторов, уменьшает возбудимость кашлевого центра. В рекомендуемых терапевтических дозах не вызывает угнетения дыхательного центра, не нарушает функцию мерцательного эпителия и не уменьшает бронхиальную секрецию, усиливает действие анальгетиков, снотворных и седативных лекарственных средств. Активация опиоидных рецепторов в кишечнике вызывает расслабление гладких мышц, снижение перистальтики и спазм всех сфинктеров.

Терпингидрат усиливает секрецию бронхиальных желез, обладает отхаркивающим действием. Натрия гидрокарбонат сдвигает рН бронхиальной слизи в щелочную сторону, снижает вязкость мокроты, в определенной степени стимулирует также моторную функцию мерцательного эпителия и бронхиол.

Терпинкод® ослабляет кашлевой рефлекс и способствует выведению слизи из дыхательных путей при кашле. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч.

**Показания к применению**

"Сухой" кашель различной этиологии при заболеваниях легких и дыхательных путей (в т.ч. бронхопневмония, бронхит, эмфизема легких) у взрослых и детей старше 12 лет.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, одновременный прием этанола или наркотических анальгетиков, детский возраст (до 12 лет), беременность и период лактации.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - 5 сут.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции (кожный зуд, крапивница).

Тошнота, рвота, запоры, головная боль, сонливость.

При длительном бесконтрольном применении возможно развитие зависимости к кодеину.

### **Передозировка**

Симптомы: рвота, сонливость, атония мочевого пузыря, ухудшение координации движений глазных яблок с нарушением зрения, брадикардия, угнетение дыхательного центра, аритмии, брадикардия.

*Лечение:* промывание желудка с активированным углем и калия перманганатом, введение дыхательных analeптиков, атропина и конкурентного физиологического антагониста кодеина-налоксона.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Хлорамфеникол тормозит метаболизм кодеина в печени и тем самым усиливает его действие. При одновременном применении лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, возможно усиление седативного эффекта и угнетающего действия на дыхательный центр. Кодеин усиливает действие этанола на психомоторные функции.

При применении кодеина в больших дозах действие сердечных гликозидов (дигоксин и др.) может усиливаться, т.к. в связи с ослаблением перистальтики усиливается их всасывание. Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание кодеина.

### **Особые указания**

У больных с нарушениями функции почек выведение кодеина замедлено, поэтому рекомендуется удлинить интервалы между приемами препарата.

В связи с возможностью развития седативного действия во время лечения не рекомендуется заниматься видами деятельности, требующими повышенного внимания, быстроты психических и двигательных реакций.

Во время приема препарата нельзя употреблять алкоголь. Спортсменам следует помнить, что препарат содержит кодеин и является допингом.

### **Форма выпуска**

Таблетки. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1 упаковка с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Наименование и адрес изготовителя/организация, принимающая претензии:**

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", 634009, г. Томск, пр. Ленина, 211,