

## **УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники МЗ РФ**

**В.Е. Акимочкин**

**30 июня 2003г**

**ОДОБРЕНО Фармакологическим комитетом МЗ РФ**

**13 марта 2003 г**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТРОКСЕРУТИН ЛЕЧИВА (TROXERUTIN LECIVA)**

### **Торговое название препарата**

ТРОКСЕРУТИН ЛЕЧИВА

### **Международное непатентованное название**

Троксерутин

### **Лекарственная форма.**

Капсулы.

### **Состав.**

Активное вещество.

Троксерутин 300 мг в 1 капсуле.

Вспомогательные вещества:

макроголь, магния стеарат, желатин, титана диоксид (Е 171), хинолин желтый (Е 104), железа оксид красный (Е 172) или сансет желтый (Е110).

### **Описание.**

Твердые желатиновые капсулы (корпус белого цвета, колпачок желтого цвета) Содержимое капсул - гранулы жёлтого цвета, содержимое капсулы может иметь вид уплотнённой массы в форме цилиндра.

### **Фармакотерапевтическая группа.**

Ангиопротекторное средство. Код АТХ [C05CA04]

### **Фармакологические свойства.**

#### **Фармакодинамика**

Венотонизирующее, ангиопротекторное средство, биофлавоноид. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, улучшает микроциркуляцию, оказывает противоотечное действие. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови. Снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов.

Применение Троксерутина Лечива возможно как на начальных, так и на поздних стадиях лечения хронической венозной недостаточности, возможно применение в качестве одного из компонентов

комплексного лечения.

### **Фармакокинетика**

После приёма внутрь препарат абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в плазме отмечается в среднем через 2 часа после приема, терапевтический уровень в плазме поддерживается в течение 8 ч. Метаболизируется в печени, частично выводится в неизменном виде с мочой и желчью.

### **Показания к применению**

Хроническая венозная недостаточность; трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы); варикозное расширение вен; поверхностный тромбофлебит, перифлебит; посттромботический синдром; посттравматический отек, гематомы; геморрой; диабетическая ангиопатия, ретинопатия.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения).

С осторожностью следует применять препарат (длительное применение) при почечной недостаточности.

### **Применение препарата в период беременности и кормления грудью.**

С осторожностью следует применять Троксерутин Лечива во время беременности, возможность применения препарата во время беременности определяется врачом, не рекомендуется применять препарат во время кормления грудью.

### **Способ применения и дозы.**

Капсулы следует проглатывать целиком, во время еды.

Обычно назначают 1 капсулу внутрь 3 раза в сутки, в качестве поддерживающей терапии - 1 капсулу 2 раза в сутки.

Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели, необходимость более длительного лечения определяется индивидуально.

### **Побочные действия**

Головная боль, раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции в виде кожных высыпаний и зуда.

### **Передозировка**

При передозировке возможно появление следующих симптомов: возбуждение, тошнота, головная боль и приливы крови. При передозировке пациентам необходимо промыть желудок, принять активированный уголь, обратиться к врачу. При необходимости проводят симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

При одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

### **Особые указания.**

Приём препарата Троксерутин Лечива не оказывает влияния на двигательные и психические реакции, не препятствует управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Опыт применения препарата у детей в возрасте до 15 лет отсутствует. При лечении поверхностного тромбоза или тромбоза глубоких вен применение препарата Троксерутин Лечива не исключает необходимость назначения средств противовоспалительной и противотромботической терапии.

**Форма выпуска**

Капсулы: 30 шт в упаковке

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре 10-25 ° С. Хранить в месте, недоступном для детей.

**Срок годности**

3 года.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Отпуск без рецепта.

**Название и адрес изготовителя**

Лечива а.о.