

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

# **УМКАЛОП / UMCKALOR®**

**Регистрационный номер:** Л N010150-010911

**Торговое название препарата:** УМКАЛОП / UMCKALOR®

**Лекарственная форма:** раствор для приёма внутрь

### **Состав**

100 г раствора содержит:

*Активные компоненты:*

пеларгонии сидовидной корней экстракт жидкий EPs 7630 \* (1 : 8-10) - 80 г,  
экстрагент - этанол 11 % (масс/масс)

*Вспомогательные компоненты:*

Глицерол 85 % - 20 г

### **Описание**

Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное средство растительного происхождения

### **Фармакологические свойства**

Оказывает противомикробное действие, обладает муколитическими свойствами, способствует повышению неспецифической резистентности организма.

### **Фармакокинетика**

Пеларгонии сидовидной корней экстракт жидкий содержит большое количество биологически активных веществ, которые в совокупности определяют его фармакологическую активность. Поэтому данные о фармакокинетике отдельных химических компонентов, входящих в состав экстракта, недостаточны для экстраполяции на препарат в целом.

### **Показания к применению**

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов (синусит, ринофарингит, тонзиллит, бронхит) в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, предрасположенность к кровотечениям, тяжелые заболевания печени и почек, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года (в связи с наличием в препарате спирта этилового), одновременное применение препаратов, ингибирующих коагуляцию.

### **С осторожностью**

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, нарушение функции печени и почек (отсутствует опыт применения), детский возраст с 1 года.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать внутрь по 20-30 капель 3 раза в день; детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 10-20 капель 3 раза в день; детям от 1 года до 6 лет - по 5-10 капель 3 раза в день.

Препарат следует принимать за 30 минут до еды с небольшим количеством жидкости.

При дозировании препарата держите флакон вертикально, при необходимости слегка постукивая по дну флакона.

После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение в течение нескольких дней для предотвращения рецидива. Средняя продолжительность курса лечения составляет 10 дней.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. В очень редких случаях возможны тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея.

#### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата до настоящего времени не сообщалось. Препарат обладает хорошей переносимостью.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При одновременном применении с антикоагулянтами, в том числе с производными кумарина, возможно усиление их антикоагулянтного действия и возникновение кровотечений (кровотечение из носа, кровоточивость десен).

#### **Особые указания**

В процессе хранения жидкие растительные экстракты имеют тенденцию к помутнению, однако это не отражается на их фармакологической эффективности. Поскольку Умкалор является природным продуктом, возможны незначительные изменения цвета и вкуса препарата.

В связи с содержанием этанола 12% (%/об) в препарате нужно учитывать, что максимальная разовая доза для детей старше 12 лет и взрослых содержит 0,125 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза для детей старше 12 лет и взрослых содержит 0,375 г абсолютного этилового спирта. Разовая доза для детей младше 12 лет содержит менее чем 0,1 г абсолютного этилового спирта.

При применении препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

#### **Форма выпуска**

Раствор для приёма внутрь; по 20 мл и 50мл во флаконе из тёмного стекла гидролитического класса III, снабжённом капельницей из полиэтилена низкой плотности и завинчивающейся крышкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

#### **Условия хранения.**

Хранить при температуре от 15 °С до 25. °С

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности:**

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия флакона хранить не более 3 месяцев.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец РУ**

ISO-Arzneimittel GmbH & Co. KG Bunsenstrasse 6-10 76275 Ettlingen, Germany

ИЗО- Арцнайmittel ГмбХ & Ко.КГ Бунзенштрассе 6-10 76275 г. Эттинген, Германия Телефон: +49 7243 106 03 Телефакс: +49 7243 106 169

**Производитель**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Willmar-Schwabe-Strasse, 4 76227 Karlsruhe, Germany

Tel.+49(721)4005 202

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ&Ко.КГ Вильмар-Швабе-Штрассе, 4 76227 Карлсруэ, Германия

Тел.+49(721)4005 202

**Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителя**

117513 г. Москва, ул. Островитянова, д.6