

Регистрационный номер: ЛСР- 002282/08

Торговое название препарата: Венарус®

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой

Описание: Таблетки, покрытые оболочкой, оранжево-розового цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы со скругленными концами, с риской; на поперечном разрезе видны два слоя.

Состав:

Активные вещества:

диосмин 450 мг,
гесперидин 50 мг

Вспомогательные вещества (ядро): желатин, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, натрия крахмала гликолят натрия, тальк.

Вспомогательные вещества (оболочка): полиэтиленгликоль 6000, магния стеарат, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид желтый.

Фармакотерапевтическая группа: Ангиопротектор

Код АТХ: C05CA53

Фармакологические свойства

Фармакодинамика: Оказывает ангиопротекторное и вентонизирующее действие. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой. Снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность. Улучшает микроциркуляцию и лимфоотток.

При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.

Фармакокинетика: период полувыведения составляет - 11 ч. Выводится желудочно-кишечным трактом и почками.

Показания:

- венозная недостаточность нижних конечностей функциональной и органической природы (ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения);
- острый и хронический геморрой.

Противопоказания:

- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Режим дозирования: внутрь.

При венозной недостаточности по 1-2 таблетки/сут. (в полдень и вечером во время еды).

При остром геморрое по 6 таблетки/сут. в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки/сут. в течение 3 дней.

Побочные эффекты: диспепсия, вегетативная лабильность

Передозировка: Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Особые указания: при беременности применение возможно (эксперименты не показали тератогенных эффектов, и до настоящего времени не было сообщений о каких-либо нежелательных явлениях при применении препарата у беременных женщин), при лактации – не рекомендуется из-за отсутствия данных о попадании препарата в грудное молоко. При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения должна быть короткой. В случае если короткая терапия не дает положительного эффекта необходимо провести проктологическое исследование и пересмотреть применяемую терапию.

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой 500 мг. По 10 или 15 таблеток, покрытых оболочкой, в контурную ячейковую упаковку. По 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения:

Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Отпуск из аптек: по рецепту.

Производитель/ предприятие принимающее претензии:

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»,
142279, Московская обл., Серпуховский р-он, п. Оболенск, корп.7-8