

ИНСТРУКЦИЯ **по медицинскому применению препарата**

ВЕНИТАН® / VENITAN®

Регистрационный номер

Торговое название: Венитан®

Лекарственная форма

Крем для наружного применения

Описание

Светло-желтый с коричневым оттенком гомогенный крем

Состав

1 г крема для наружного применения содержит

активное вещество: эсцин 10.0 мг (соответствует 50 мг экстракта каштана конского)

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат, сорбиновая кислота, тристеарил сеарат, вазелин белый, парафин жидкий (масло минеральное), цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%; Ланетте О), глицерил каприлокапрат (Миглиол 812), пропиленгликоль, кремния диоксид коллоидный (Аэросил 200), гидроксипропилцеллюлоза (Полимер JR – 400 UC), симетикон, полисорбат 40, очищенная вода.

Фармакотерапевтическая группа

Венотонизирующее средство растительного происхождения

Код АТХ: C05CX.

Фармакологические свойства

Эсцин содержится в семенах конского каштана (*Aesculus hippocastanum L., semen*).

Представляет собой смесь тритерпеновых сапонинов. Эсцин оказывает противовоспалительное действие в основном в начальной фазе воспалительной реакции, «уплотняя» стенки капилляров и снижая, таким образом, их проницаемость, повышенную при воспалении. Эсцин также оказывает положительное влияние при ломкости стенок капилляров и повышает тонус венозных стенок при его ослаблении. Все это приводит к уменьшению застоя в венозном русле и накопления жидкости в тканях, препятствуя появлению отеков.

Показания к применению

- Венозная недостаточность (боли и чувство тяжести в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах, кожный зуд, отечность ног), ощущение тяжести в ногах при беременности или длительном стоянии;
- варикозное расширение вен;
- травмы (ушибы, отек мягких тканей, посттравматические гематомы, растяжение связок), инфильтраты после инъекций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

С осторожностью

Склонность к тромбозам.

Применение при беременности и в период лактации

Ограничений применения при беременности или грудном вскармливании нет. В связи с ограниченной степенью всасывания лекарственных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного действия. Вместе с тем, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно.

Тонкий слой крема Венитан® следует нанести на кожу болезненных участков и вокруг них и осторожно втереть. Крем следует наносить 2-3 раза в сутки.

При варикозном расширении вен нижних конечностей рекомендуется также применять эластичный бинт или носить специальные стягивающие колготы.

Побочное действие

В очень редких случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности (крапивница, кожная сыпь, кожный зуд). В этих случаях следует немедленно прекратить лечение и обратиться к врачу.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Венитан® отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не отмечено.

Особые указания

Не следует наносить крем на поврежденную кожу, слизистые оболочки, а также при наличии гнойных процессов. Не массировать при нанесении. При внезапном появлении сильно выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и боль), особенно на одной ноге, следует исключить тромбоз вен нижних конечностей. При появлении упомянутых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Форма выпуска

По 50 г крема для наружного применения в алюминиевых тубах, 1 туба с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Лек д.д.,

Веровшкова 57, г.Любляна, Словения

Претензии потребителей направлять в Представительство в РФ:

119002, Москва, Староконюшенный пер., 10/10, стр.1

Тел. 258-84-84, факс 258-84-85