

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ**

**Торговое название:** ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ

**Лекарственная форма:** спрей назальный

**СОСТАВ:** на 100 мл

**Действующие вещества:**

Неомицин сульфат 650 000 МЕ

Полимиксин сульфат 1 000 000 МЕ

Дексаметазона натрия метасульфобензоат 0,025 г

Фенилэфрина гидрохлорид 0, 25 г

**Вспомогательные вещества:** метилпарабен, лития хлорид, лимонной кислоты моногидрат, лития гидроксид, макроголь 400, полисорбат 80, вода дистиллированная q.s. до 100 мл

**ОПИСАНИЕ:** прозрачная бесцветная жидкость

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:**

антибиотики - аминогликозид и циклический полипептид + глюкокортистероид+ альфа-адреномиметик.

КодАТХ:[802СА06]

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:**

Комбинированный противовоспалительный препарат для местного применения в отоларингологии.

Обладает противовоспалительным действием дексаметазона на

слизистую оболочку носа, антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух.

**ПОКАЗАНИЯ:**

Воспалительные и инфекционные заболевания носовой полости, глотки, придаточных пазух носа:

- острый и хронический ринит;
- острый и хронический ринофарингит;
- синусит

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- подозрение на закрытоугольную глаукому;
- одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы;
- вирусные заболевания;
- заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 2, 5 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:**

**Взрослым:** по 3-5 впрыскиваний в сутки в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

**Детям в возрасте от 2,5 до 15 лет** - по 3 впрыскивания в каждую ноздрю в течение 5-10 дней.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

Аллергические реакции, редко - кожные проявления.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА:**

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:**

Лекарственное взаимодействие обусловлено содержанием фенилэфрина. При одновременном применении гуанетидин и препараты этой группы усиливают гипертензивный эффект фенилэфрина и, благодаря снижению симпатического тонуса гуанетидином, возможен длительный мидриаз, если нельзя избежать подобной комбинации, то необходимо наблюдение врача.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Не применять для промывания придаточных пазух носа.

Не применять у больных с почечной недостаточностью.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, гипертиреозом.

Вниманию спортсменов: препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный эффект при допинг-контроле.

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:**

Противопоказан в период беременности и грудного вскармливания.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Назальный спрей.

Светонепроницаемый полиэтиленовый флакон емкостью 15 мл с распыляющим наконечником в картонной коробке.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Список Б.

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:**

По рецепту врача.