

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

АНТИСТАКС®

Регистрационный номер: П№015635/01 от 30.04.04

Торговое патентованное название: Антистакс® (Antistax®)

Лекарственная форма:

Капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Винограда красных листьев экстракт сухой - 180,00 мг

Вспомогательные вещества:

Кремния оксид коллоидный безводный	- 9,35 мг
Декстроза (сироп глюкозы сухой)	- 38,25 мг
Крахмал кукурузный	- 8,40 мг
Магния стеарат	- 2,60 мг
Тальк	- 8,40 мг
Теоретическая масса содержимого капсулы	- 247,00 мг

Оболочка капсулы:

Желатин	- 63,004 мг
Натрия додецилсульфат	- 0,152 мг
Вода очищенная	- 11,020 мг
Титана диоксид	- 0,760 мг
Железа оксида гидратат (Е 171) (железа оксид желтый)	- 0,152 мг
Железа оксид (Е 172) (железа оксид красный)	- 0,912 мг
Масса капсулы с содержимым	- 323,00 мг

Описание:

Твердые желатиновые капсулы красно-коричневого цвета, размер 1. Содержимое капсул - порошок коричневого или коричневого с красновато-фиолетовым оттенком цвета, с характерным, слегка ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

Капилляропротекторное средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Экстракт из красных листьев винограда содержит фармакологически активные флавоноиды, основными из которых являются кверцетин-глюкуронид и изокверцетин. Препарат оказывает защитное действие на эпителий сосудов (стабилизируя мембраны) и увеличивает эластичность сосудов (нормализуя сосудистую проницаемость). Снижение

проницаемости сосудистой стенки для плазмы, белков или воды из сосудов в окружающую ткань замедляет образование отеков и уменьшает уже существующие отеки.

Показания

Профилактика и симптоматическое лечение хронической венозной недостаточности (в сочетании с варикозным расширением вен), включая отеки нижних конечностей, ощущения тяжести и усталости в нижних конечностях, чувство напряжения, парестезии (изменение чувствительности) и боль.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам данного препарата.

Беременность и лактация

АНТИСТАКС® не рекомендуется принимать во время беременности и в период лактации. Исследования по безопасности применения препарата у беременных и кормящих грудью не проводились.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 2 капсулы день и должна приниматься утром до еды. Доза может быть увеличена до 4 капсул в день. Капсулы следует проглатывать целиком и запивать водой.

Побочные эффекты

Аллергические реакции.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не известны.

Передозировка

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось.

Особые указания

В случае недостаточного или неудовлетворительного симптоматического эффекта в течение 6-ти недель лечения, следует рекомендовать пациенту проконсультироваться у врача в отношении других возможных причин отеков.

Форма выпуска

По 10 капсул в блистерах; 2, 5, 10 или 16 блистеров помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

В сухом и недоступном для детей месте, при температуре 15-25°C.

Срок годности

36 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Фарматон СА, Швейцария Швейцария, Лугано-Биоджио, Виа Мулини, СН-6934 Via
Mulini, СН-6934 Lugano-Bioggio, Switzerland