

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

## **АСКОРУТИН**

**Регистрационный номер:** P N000557/01-310807

**Торговое название препарата:** Аскорутин

**Международное непатентованное или группировочное название:** аскорбиновая кислота + рутозид

**Лекарственная форма:** таблетки

### **Состав:**

1 таблетка содержит:

*Активные вещества:* Кислоты аскорбиновой - 0,05 г Рутозида (рутина) -0,05 г

*Вспомогательные вещества:*

сахароза (сахар), крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк.

**Описание:** таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** витамин

**Код АТХ:** C05CA51

### **Фармакологические свойства**

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Рутин устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая ее отечность и воспаление. Обладает антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции.

### **Показания к применению**

Профилактика гипо- и авитаминоза аскорбиновой кислоты и рутина.

В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен с отечным и болевым синдромами, поверхностном тромбофлебите, трофических нарушениях и язвах, при хронической венозной недостаточности, при геморрагическом диатезе.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

### **С осторожностью**

Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам.

### **Способ применения и дозы**

Внутри по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 недели.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.**

Аскорбиновая кислота повышает всасывание антибиотиков группы пенициллина и препаратов железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

### **Форма выпуска**

Таблетки. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и

фольги алюминиевой печатной лакированной. По 50 таблеток в банки полимерные в комплекте с крышками. Каждую банку или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещать в коробки из гофрированного картона. Банки полимерные допускается помещать в ящики из гофрированного картона с отделением каждого ряда прокладками гофрированными с приложением инструкций по применению в количестве, равном количеству упаковок.

**Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Претензии от покупателей принимает предприятие-изготовитель:**

ОАО «Валента Фармацевтика»,

141101, г. Щелково, Московская область, ул. Фабричная, 2.