

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Бронхикум[®] ТП

Bronchicum[®] TP

Регистрационный номер: ЛСР-005678/08 от 21.07.2008.

Торговое название препарата: Бронхикум[®] ТП.

Лекарственная форма: эликсир.

Состав

В 100 г эликсира содержится:

– *активные компоненты:*

экстракт травы тимьяна жидкий	5,0 г
экстракт корней первоцвета жидкий	2,5 г

– *вспомогательные компоненты:*

натрия бензоат, сахарный сироп специальный*, вода очищенная.

* – смесь сахарозы, декстрозы (глюкозы) и фруктозы.

Описание активного компонента: экстракт травы тимьяна жидкий (*Thymus vulgaris* L).

Соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5.

Экстрагент: раствор аммиака 10% (масса/масса), глицерин 85%, спирт этиловый 90% (об/об), вода; в соотношении 1:20:70:109.

Описание активного компонента: экстракт корней первоцвета жидкий (*Primula veris* L).

Соотношение корней первоцвета к экстрагенту 1:2-2,5. Экстрагент: спирт этиловый 70% (масса/масса).

Описание: прозрачный или слегка мутный раствор от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета со слабо выраженным запахом тимьяна.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA10.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (бронхита, трахеита и др.), сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахарозы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции

печени и почек, детский возраст (до 1 года).

В связи с содержанием в препарате этилового спирта эликсир Бронхикум ТП не должен использоваться у больных алкоголизмом.

С осторожностью и только после консультации с врачом следует принимать эликсир пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другого режима дозирования, взрослым и подросткам назначают внутрь по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 6 раз в сутки.

Детям от 5 до 12 лет – по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 4 раз в сутки.

Детям от 1 года до 4 лет – по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) до 3 раз в сутки.

Эликсир следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Средний курс лечения составляет 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

В редких случаях возможны следующие реакции:

аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке);

со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, гастрит, диспепсия.

В этих случаях, а также в случае развития каких-либо нежелательных явлений, не указанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме эликсира Бронхикум ТП.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Эликсир Бронхикум ТП содержит 5,46 объемных % спирта этилового. В случае, если улучшение состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры, следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом

5 мл эликсира (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0,36 ХЕ (хлебных единиц).

Форма выпуска

Эликсир. По 130 г препарата в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению упакован в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25°C. Хранить в недоступном для детей месте

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес производителя

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия. Наттерманнallee 1, Д-50829, Кёльн, Германия.

Претензии потребителей направлять по адресу:

115035, Москва, ул. Садовническая, дом 82, стр. 2.