

## **ИНСТРУКЦИЯ** **по медицинскому применению препарата**

# **БРОНХИКУМ® С**

**Регистрационный номер:** ЛСР-010619/08.

**Торговое название препарата:** Бронхикум С.

**Лекарственная форма:** пастилки.

### **Состав (на 1 пастилку)**

*Активный компонент:*

экстракт травы тимьяна жидкий - 100,000 мг.

*Вспомогательные компоненты:* сахароза, повидон, левоментол, цинеол, акации камедь, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Описание активного компонента: экстракт травы тимьяна жидкий.

(*Thymus vulgaris* L, сем. Lamiaceae).

Соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5.

Экстрагент: раствор аммиака 10%, глицерин 85%, спирт этиловый 90% (об/об), вода; в соотношении 1:20:70:109.

**Описание:** круглые, слегка двояковыпуклые пастилки кремового цвета с небольшими вкраплениями.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения

**Код АТХ:** R05CA10.

### **Фармакологическое действие**

Обладает отхаркивающим и муколитическим действием.

### **Показания к применению**

В качестве симптоматического средства при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 6 лет).

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Пастилки рассасывают в полости рта.

Взрослым и детям старше 12 лет следует рассасывать в полости рта по 1-2 пастилки несколько раз (до 3 раз) в день. Детям от 6 до 12 лет - по 1 пастилке 3 раза в день. Длительность применения препарата определяется степенью выраженности симптомов заболевания и его продолжительностью.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек лица и слизистой оболочки полости рта и глотки (отек Квинке). В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

Одна таблетка соответствует 0,07 ХЕ (хлебных единиц), что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

При отсутствии улучшения состояния в течение 5 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Форма выпуска**

Таблетки. По 10 таблеток в блистерах из ПВХ/алюминиевой фольги. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре ниже 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Произведено**

А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия.

Наттерманнallee 1, D-50829 Кельн, Германия.

### **Претензии потребителей направлять по адресу в России:**

115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2.