

Регистрационный номер: РN№ 001049/01 от 05.03.2010

Торговое название: ЦИКЛОФЕРОН® (CYCLOFERON®).

Лекарственная форма: линимент.

Состав: 1 мл линимента содержит:

активное вещество — меглюмина акридонатацетат в пересчёте на акридонуксусную кислоту — 50,0 мг, полученный по следующей прописи: акридонуксусная кислота - 50,0 мг, N-метилглюкамин (меглюмин) - 38,5 мг:

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид — 0,1 мг, 1,2-пропиленгликоль — до 1,0 мл.

Описание: прозрачная жидкость жёлтого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство.

Код АТХ: L03AX.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЦИКЛОФЕРОН® является низкомолекулярным индуктором интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной).

ЦИКЛОФЕРОН® эффективен в отношении вируса герпеса и других возбудителей. Обладает прямым противовирусным действием, подавляя репродукцию вируса на ранних сроках (1-5 сутки) инфекционного процесса.

Основной клинический эффект действия линимента ЦИКЛОФЕРОН® связан с индукцией раннего а-интерферона. Препарат нормализует цитокиновый дисбаланс оппозитных форм иммунного ответа. Местное фармакотерапевтическое действие препарата ЦИКЛОФЕРОН® обусловлено стимуляцией локального иммунного ответа в лимфоидной ткани слизистой оболочки.

Эффективность линимента ЦИКЛОФЕРОН® при лечении хронических пародонтитов проявляется в подавлении роста патогенных микроорганизмов и нормализации уровня секреторного иммуноглобулина А в жидкости зубодесневых карманов, что обеспечивает качественную санацию ротовой полости, способствуя уменьшению воспаления и кровоточивости дёсен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

У взрослых в комплексной терапии:

- герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек;
- неспецифических вагинитов и вагинозов;
- хронических пародонтитов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Местно:

При герпетической инфекции линимент наносят тонким слоем на пораженный участок 1-2 раза в сутки в течение пяти дней. При генигальном герпесе — интравагинальные инсталляции один раз в сутки по 5 мл в течение 10-15 дней ежедневно.

При терапии неспецифического вагинита и бактериального вагиноза: препарат вводят интравагинально по 5—10 мл ежедневно в течение 10-15 дней 1-2 раза в сутки. Возможно применение тампонов, пропитанных линиментом.

При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными средствами (вагинальными таблетками, суппозиториями).

Для применения интравагинально: вскрыть тубу, проколоть мембрану при помощи шприца (объем 5 мл) с одноразовой иглой, набрать линимент, снять и выбросить иглу. В положении лёжа ввести наполненный шприц во влагалище и с помощью поршня выдавить линимент.

При наличии в упаковке вагинального аппликатора проколоть мембрану тубы, установить аппликатор на отверстие. Выдавить линимент в полость аппликатора, пока весь поршень не будет вытолкнут. Наполненный аппликатор снять с отверстия зубы, ввести во влагалище и с помощью поршня выдавить линимент.

Для предотвращения свободной эвакуации препарата вход во влагалище тампонируется небольшим стерильным ватным тампоном на 2-3 часа.

В случае необходимости можно повторить курс через 14 дней.

При лечении хронического пародонтита перед применением линимента желательно промыть пародонтальные карманы антисептиком, затем нанести ватным тампоном препарат в объеме 1,5 мл на десну методом аппликации (не втирать) 1-2 раза в сутки с интервалом 10-12 часов. Длительность терапии 12-14 дней, В случае необходимости повторить курс через 14 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции. Возможно кратковременное жжение, незначительная локальная гиперемия. Побочные эффекты слабо выражены и не требуют отмены препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Линимент ЦИКЛОФЕРОН® совместим со всеми лекарственными препаратами, традиционно применяемыми при лечении указанных заболеваний (химиотерапевтические препараты и др.).

При хронических формах заболеваний препарат хорошо сочетается с другими лекарственными средствами (вагинальными таблетками и суппозиториями).

Усиливает действие антибиотиков, антисептиков и противогрибковых препаратов.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Сведения о передозировке препарата отсутствуют,

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат имеет горький вкус.

Не рекомендуется интенсивно втирать препарат в десну.

Не допускать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. В случае попадания - промыть глаза водой. Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами. При отсутствии лечебного эффекта необходимо обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Линимент 5 % по 5 мл в инсулиновых флаконах, 5 флаконов в односторонней контурной ячейковой упаковке, 1 контурная ячейковая упаковка вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

По 5 мл или 30 мл в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. В пачку с тубой 30 мл вкладывают 5 аппликаторов вагинальных, либо упаковывают без аппликаторов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте при температуре 15-25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Препарат не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Производитель: ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»

(ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»). Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, кор. 2, лит. А.
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.