

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

## **ДИМЕФОСФОН**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** ДИМЕФОСФОН

**Международное непатентованное название (МНН):** диметилноксобутилфосфонилдиметилат

**Лекарственная форма:** раствор для приема внутрь

**Состав:**

*Активное вещество:* диметилноксобутилфосфонилдиметилат 150 г.

*Вспомогательные вещества:* воды очищенной до 1 литра.

**Описание:** бесцветная или желтоватая, прозрачная или опалесцирующая жидкость со своеобразным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антиацидотическое средство

**Код АТХ V03AX**

### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Нормализует кислотно-щелочное состояние при ацидозах различной этиологии.

Антиацидотическое действие реализуется за счет интенсификации почечного и легочного механизмов регуляции кислотно-щелочного состояния, усиления внутриорганного кровотока и тканевого метаболизма. Проявляет мембраностабилизирующее и противовоспалительное действие. При наружном применении оказывает антисептическое действие, повышает защитные функции кожи и слизистых оболочек.

### **Показания к применению**

Внутрь, в составе комплексной терапии: черепно-мозговая травма, послеоперационный период нейрохирургических операций, болезнь Меньера, посттравматический синдром, дыхательная недостаточность при инфекционно-воспалительных заболеваниях (ОРВИ, грипп, туберкулез, пневмония и др.), а также при терапии состояний сопровождающихся ацидозом.

Наружно: раны, трофические язвы, рожистое воспаление, ожоги, профилактика гнойно-воспалительных осложнений в местах выхода спиц аппарата Илизарова.

### **Противопоказания:**

гиперчувствительность, эпилепсия, хроническая почечная недостаточность 2-3 степени.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь - после еды, запивая водой. Взрослым по 15-25 мл 3-4 раза в день. Дети по 1-1,5 мл на каждые 5 кг массы тела ребенка 3-4 раза в день.

Наружно - наносится на повязку, тампоны, турунды и марлевые салфетки, ежедневно в течение 3-14 дней. При наложении аппарата Илизарова, на область выхода спиц ежедневно накладывают марлевые салфетки с Димефосфоном в течение 7-14 дней.

При рожистом воспалении - смазывают зону воспаления 3 раза в день в течение 3-5 дней.

### **Побочное действие:**

Диспептические явления, сонливость.

### **Передозировка**

Усиление выраженности побочных эффектов. Лечение - промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты.

**Форма выпуска**

Раствор для приема внутрь 15% во флаконах оранжевого стекла по 100 мл.  
Флакон с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Условия хранения:**

В прохладном, защищенном от света, и недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:**

По рецепту

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ОАО "Татхимфармпрепараты "  
Россия, 420091, г. Казань, ул. Беломорская, 260