

**Инструкция  
по медицинскому применению препарата**

**ФИНАЛГЕЛЬ®**

**Регистрационный номер:** N016210/01-150210

**Торговое (патентованное) название:** Финалгель®

**Международное непатентованное название:** пироксикам

**Лекарственная форма**  
гель для наружного применения

**Состав:**  
В 1 г геля содержится; активного вещества пироксикама - 5 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная

**Описание:**  
Прозрачный или слегка опалесцирующий светло-желтого цвета гель со слабым запахом изопропилового спирта

**Фармакотерапевтическая группа:**  
нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)  
Код АТХ: M02AA07

**Фармакологические свойства**  
Обладает противовоспалительным, обезболивающим, местным охлаждающим действием. Неселективно подавляет циклооксигеназу 1 и 2.

**Фармакокинетика**  
После нанесения 4 г препарата на кожу максимальная концентрация пироксикама в системном кровотоке составляет  $149,2 \pm 30,3$  нг / мл.

**Показания**  
Болевой синдром: анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, тендинит, тендовагинит, плече-лопаточный синдром; спортивные травмы (ушибы, вывихи, повреждение связок).

**Противопоказания**

- гиперчувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата;
- гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или к другим НПВП;
- беременность (III триместр);
- почечная недостаточность;
- возраст до 14 лет.

*С осторожностью*  
бронхиальная астма, аллергический ринит, рецидивирующий полипоз носа и

околоносовых пазух, хронические обструктивные заболевания легких или хронические легочные инфекции.

#### *Беременность и период лактации*

Финалгель® следует с осторожностью применять во время I и II триместра беременности. Пироксикам в незначительных количествах может проникать в грудное молоко, поэтому не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно. Взрослым и детям старше 14 лет по 1 г геля (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза в день. Гель следует нанести на кожу над пораженной областью и слегка втереть.

Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах и плече-лопаточном синдроме; 1-2 недели при спортивных травмах.

#### **Побочное действие**

- местное раздражение кожи (воспаление, покраснение, крапивница, зуд, шелушение);
- местные аллергические реакции.

#### **Передозировка**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, в единичных случаях не исключается возникновение системных побочных эффектов: головной боли; нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в эпигастриальной области); одышки.

Описан единичный случай развития интерстициального нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом.

В случае появления симптомов передозировки препарат следует отменить и обратиться к врачу. Лечение: симптоматическое.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не известно.

#### **Особые указания**

Пациенты, страдающие бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими легочными инфекциями, как правило, более чувствительны к применению НПВП. У этих пациентов могут участиться приступы астмы, появиться отек Квинке и крапивница. Не следует наносить гель на поврежденные кожные покровы, в том числе открытые раны. Избегать попадания в глаза.

#### *Влияние на способность водить машину или работать с механизмами*

Не известно.

#### **Форма выпуска**

Гель для наружного применения 0,5%. По 35 г или 50 г в тубу алюминиевую, закрытую колпачком из пластмассы с пробойником для мембраны. Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Срок годности 5 лет, 6

месяцев с момента вскрытия тубы.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Бингерштрассе, 173, 55216 Ингельхаим-на-Рейне, Германия,

произведено С.П.М. КонтрактФарма ГмбХ и Ко. КГ, Фрюлингштрассе, 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия.

*Претензии потребителей направлять по адресу Представительства в Москве:  
119049, Москва, ул. Донская, 29/9, строение 1*