

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

### **Геломиртол® (Gelomyrtol®)**

**Регистрационный номер:** 012303/01

**Торговое название препарата:** ГелоМиртол®

**Международное непатентованное название или группировочное название:** Миртол

**Лекарственная форма:** капсулы кишечнорастворимые

#### **Состав:**

1 капсула препарата содержит:

*Активное вещество:*

Миртол стандартизированный 120 мг на минимальное содержание:

лимонена 30 мг

цинеола 30 мг

$\alpha$ -пинена - 8 мг

*Вспомогательное вещество:* среднецепочечные триглицериды

Состав капсулы: желатин, глицерол (85%), сорбитол (70%), хлористоводородная кислота 13%

Кишечнорастворимая оболочка капсулы: фталат гипромеллозы, дибутилфталат

#### **Описание**

Шарообразные мягкие полупрозрачные желатиновые капсулы. Содержимое капсул - маслянистая прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**КОД АТХ:** R05C

#### **Фармакологические свойства**

Оказывает муколитическое, противовоспалительное, антибактериальное действие.

Фармакокинетические свойства

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-3 часа после приема препарата. Приблизительно 60% препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5% - с калом, около 2% - легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

#### **Показания к применению**

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (синуситы, острый и хронический бронхиты).

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1 триместр беременности, период лактации, детский возраст до 10

лет.

### **Применение при беременности**

В связи с отсутствием специальных исследований в период беременности (II-III триместр) следует применять с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

### **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь, у взрослых и детей старше 10 лет, за 30 минут до еды, запивая достаточным количеством воды комнатной температуры. Взрослым назначают при остром воспалении по 2 капсулы 4-5 раз в день (8-10 капсул в сутки), при хроническом - по 2 капсулы 3 раза в день и, для облегчения отхождения мокроты утром, дополнительно принимают 2 капсулы перед сном (8 капсул в сутки).

Детям от 10 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле 4-5 раз в день, при хроническом воспалении - по 1 капсуле 2-3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется врачом.

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, тахикардия, сухость во рту, боли в желудке, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

Если после приема препарата проявляются побочные действия, не описанные в этой инструкции, то следует немедленно сообщить об этом врачу.

### **Передозировка**

При случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях кома или нарушение дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечнососудистой системы.

*Лечение:* вазелиновое масло в количестве 3 мл на килограмм массы тела; промывание желудка 5% раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не описано.

### **Форма выпуска**

Капсулы кишечнорастворимые 120 мг. По 10 капсул в блистерную упаковку. По 2 блистерных упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Название и адрес изготовителя**

G.Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG Г.Поль-Боскамп ГмбХ & Ко.КГ  
Kieler Strasse 11, Килер Штрассе 11  
D-25551 Hohenlockstedt (BRD) Д-25551 Хохенлокштедт (ФРГ)

**Адрес московского представительства/Адрес претензий по качеству претензии:**

119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 1409-А