

ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ

Фармакотерапевтическая группа

Препарат для наружного применения с антитромботическим и местноанестезирующим действием

Состав

1 г мази содержит 100 ЕД гепарина натрия; 40 мг бензокаина; 0,8 мг бензилникотината

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для наружного применения, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Постепенно освобождающийся из мази гепарин оказывает антитромботическое и умеренное противовоспалительное действие. Он способствует рассасыванию уже имеющихся и препятствует образованию новых тромбов.

Бензилникотинат расширяет поверхностные сосуды, способствуя лучшему всасыванию гепарина.

Местный анестетик бензокаин уменьшает выраженность болевых ощущений.

Показания к применению

- тромбофлебиты (преимущественно поверхностных вен);
- тромбоз геморроидальных вен;
- посттравматические гематомы;
- флебиты после в/в инъекций

Режим дозирования

Мазь наносят 2-3 раза/сут тонким слоем на область поражения (из расчета 0,5-1 г на участок диаметром 3-5 см) и осторожно втирают в кожу.

При тромбозе геморроидальных вен применяют ректальные тампоны, пропитанные мазью, или наносят мазь на тканевую прокладку, которую накладывают непосредственно на геморроидальные узлы. Мазь следует применять ежедневно до исчезновения симптомов, в среднем 3-14 дней.

Побочное действие

Возможно: аллергические реакции.

Противопоказания

- язвенно-некротические процессы в зоне тромбофлебита;
- нарушения процессов свертывания крови;
- тромбоцитопения;
- повышенная чувствительность к препарату

Особые указания

Препарат не следует наносить на открытые гнойные раны. Мазь следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Форма выпуска

25 г мази в тубе

