

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ГЕРБИОН® СИРОП ПЕРВОЦВЕТА

HERBION® COWSLIP SYRUP

Регистрационный номер: П N014840/01-160709

Торговое патентованное название: Гербион® сироп первоцвета

Лекарственная форма: сироп.

Состав:

<i>Активные вещества:</i>	5 мл	100 г
* Первоцвета весеннего корней экстракт жидкий (1:2-4,6)	1,03 г	16,6 г
** Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (1 : 3,3)	2,06 г	32,96 г
Левоментол	0,62 мг	9,92 г

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (E218), сахароза.

* Первоцвета весеннего корней экстракт жидкий (1:2-4,6) приготовлен из: Первоцвета корни (*Primula veris* L., f. *Primulaceae*),

Вода очищенная (экстрагент)

Соотношение 1:2- 4,6 соответствует соотношению лекарственного растительного сырья : экстракту; (в среднем из 1 части растительного сырья получают 3,3 части экстракта).

** Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (1 : 3,3) приготовлен из:

Тимьяна трава (*Thymus vulgaris* L., f. *Lamiaceae*),

Вода очищенная (экстрагент).

Соотношение 1 : 3,3 соответствует соотношению лекарственного растительного сырья : экстракту; (из 1 части растительного сырья получают 3,3 части экстракта).

Описание:

Сироп коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA10.

Фармакологические свойства

Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению.

Показания к применению.

Препарат применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (в том

числе бронхит, трахеит, трахеобронхит), при острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся «сухим» кашлем.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества семейства первоцветные и семейства яснотковые; дети после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп); бронхиальная астма, сахарный диабет; наследственная непереносимость фруктозы; синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы и врожденная недостаточность сахаразы-изомальтазы; детский возраст до 2-х лет.

Беременность и период лактации.

Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы пациентов).

Способ применения и дозы

Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством теплой воды.

Взрослым рекомендуется принимать по 3 мерные ложки (1 мерная ложка - 5 мл) 3-4 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 1/2 мерной ложки 3 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки после еды.

Детям старше 14 лет — по 2 мерных ложки (10 мл) сиропа 3-4 раза в сутки.

Длительность курса терапии - 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Возможны в очень редких случаях: тошнота, рвота, диарея. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов, возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Гербион® сироп первоцвета не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания.

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 3,15 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 3,15 г (1 мерная ложка - 5 мл, что соответствует 0,315 хлебным единицам) до 9,45 г (3 мерных ложки - 15 мл, что соответствует 0,945 хлебным единицам) сахарозы.

Гербион® сироп первоцвета не влияет на способность управлять автомобилем и на работу со сложными техническими механизмами.

Форма выпуска:

Сироп. По 150 мл сиропа во флаконе темного стекла (тип III), укупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.

1 флакон помещен в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой ложкой и инструкцией по применению.

Условия хранения.

Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

Производитель:

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.