

# КСИМЕЛИН (Xymelin)

**Регистрационный номер:**

**Международное непатентованное название:** ксилометазолин

**Химическое название:** 2- [ [ 4 - (1,1 -Диметилэтил )-2,6-лиметилфенил]-мстил]-4.5-дигидро-1Н-имидазол (в виде гидрохлорида)

**Лекарственная форма:** спрей назальный дозированный

## **Состав:**

1 мл раствора для интраназального применения содержит:

*Действующее вещество:* ксилометазолина гидрохлорида 0,5 мг или 1 мг.

*Вспомогательные вещества:* Натрия фосфат однозамещенный, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода очищенная.

## **Описание.**

Прозрачная бесцветная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** альфа-адреномиметик.

**Код АТХ:** R01AAG7.

## **Фармакологические свойства.**

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с  $\alpha$ -адреномиметическим действием, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах. В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемии. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10-12 часов.

## **Фармакокинетика.**

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

## **Показания к применению.**

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахеит, средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе). Детский возраст - до 2-х лет. С осторожностью - при сахарном диабете.

**Способ применения и дозы.**

Интраназально.

*0,05% спрей для детей от 2 до 6 лет:* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-2 раза в день; не следует применять более 3 раз в день.

*0,1 % спрей для взрослых и детей старше 6 лет:* По 3 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3 раз в день.

Препарат применяется не более 7 дней. Не применять у детей до 2 лет без назначения врача.

**Побочное действие.**

При частом и/или длительном применении - раздражение и или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреции. Редко - отек слизистой оболочки носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение АД, головная боль, рвота бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении высоких доз).

**Передозировка.**

Симптомы: усиление побочных эффектов.

Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

**Особые указания.**

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

*Применение во время беременности и лактации.* В период беременности и лактации препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

*Влияние на способность управлять транспортным средством или оборудованием:*

Ксилометазолин, в дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

**Форма выпуска.**

По 10 мл или 15 мл препарата во флаконе из коричневого стекла, снабженном помповым дозирующим устройством с наконечником и с защитным колпачком из полиэтилена.

Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения.**

При температуре не выше 25 С. в недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

2 года.

После вскрытия флакона использовать его содержимое в течение 3 месяцев.

**Условия отпуска из аптек.**

Без рецепта врача

Название фирмы - производителя:

Никомед Дания АпС Роскильд, Дания.

**Адрес фирмы - производителя :**

Nycomed Danmark ApS

Langebjerг 1 DK-4000 Roskilde Denmark  
Никомед Дания АпС  
Лангебьерг 1 ДК - 4000 Роскильде Дания

Представительство в России: ООО "Никомед Дистрибьюшн Сентэ". Москва, ул. Тимура  
Фрунзе, 24.