

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

# **ПЕРТУССИН**

**Регистрационный номер:** ЛП 000247-160211

**Торговое название препарата:** Пертуссин

**Лекарственная форма:** сироп

### **Состав на 100 г:**

Активные вещества: чабреца экстракт жидкий 12,0 г, калия бромид 1,0 г  
Вспомогательные вещества: сахарозы раствор 64 % (сахарный сироп) 82,0 г, этанол (этиловый спирт) 95 % 4,06 г, вода очищенная 0,94 г.

**Описание:** густая жидкость коричневого цвета с ароматным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство.

**Код АТХ:** R05CA

### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной системы.

**Фармакокинетика:** данные отсутствуют.

### **Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний; трахеитов, бронхитов, а также у детей при коклюше.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 3 лет). С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

### **Способ применения и дозы**

Препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день;  
детям от 3 до 6 лет - по 1/2-1 чайной ложке 3 раза в день;  
детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день;  
детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, изжога.

### **Передозировка**

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

Препарат содержит 8-11% этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - содержится до 3,9 г абсолютного этилового спирта. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, работе с движущимися механизмами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0,64 ХЕ; в 1 столовой ложке - примерно 0,96 ХЕ.

### **Форма выпуска**

Сироп. По 100, 125 г препарата во флаконы оранжевого стекла, закупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми из полимерных материалов.

По 100, 125 г препарата во флаконы оранжевого стекла из стекломассы с винтовой горловиной типа ФВБ или ФВЖ, закупоренные колпачками алюминиевыми или колпачками алюминиевыми с перфорацией.

Каждый флакон помещают в картонную пачку, на которую нанесен полный текст инструкции по медицинскому применению.

Допускается упаковка флаконов без картонной пачки вместе с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению в групповую тару.

### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре от 12 до 15 С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года. Не применять после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель/Организация, принимающая претензии:**

Открытое акционерное общество «Кировская фармацевтическая фабрика». 610000, г. Киров, ул. Московская 27 а