

Инструкция по медицинскому применению

Пиаскледин 300

Форма выпуска, состав:

капсулы с белым колпачком и непрозрачным белым корпусом с маркировкой "P 300"; содержимое капсул - паста коричневого цвета. 1 капсула. неомыляемые соединения масла авокадо 100 мг неомыляемые соединения масла сои 200 мг. Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, кремния диоксид безводный. Состав оболочки капсул: титана оксид (E171), желатин.

Фармакологическая группа:

Хондропротекторы

Фармакологическое действие:

препарат растительного происхождения, регулирующий обмен в хрящевой и костной ткани. Способствует замедлению развития дегенеративного процесса в хрящевой ткани суставов, сокращает боли в суставах, связанные с этим процессом, восстанавливает двигательную функцию заболевшего.

Оказывает регенерирующее действие на хрящ, стимулируя синтез протеогликанов и коллагена, способствует восстановлению хрящевой ткани, сокращает выработку коллагеназы. Обладает симптоматическим противовоспалительным и анальгезирующим действием на суставы.

Показания:

остеоартроз I-III стадии различной локализации (артроз коленного, тазобедренного, мелких суставов, межпозвоночный остеохондроз, плече-лопаточный периартрит, теносиновиты).

Способы приема и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 капсуле./сут. Капсулы следует принимать во время приема пищи, запивая 250 мл воды. Курс лечения до 6 мес. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно в последствии консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Противопоказания:

беременность;

период лактации (грудное вскармливание);

высокая восприимчивость к компонентам продукта.

Беременность и лактация

Особые указания

На начальном этапе лечения прием Пиаскледина 300 может быть совмещен с приемом НПВС и/или анальгетиков. По мере усиления действия Пиаскледина 300 дозу НПВС можно уменьшать.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пиаскледин 300 можно использовать водителям транспортных средств, спортсменам, т.к. он не оказывает влияние на способность пациента управлять автомобилем или заниматься опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки продукта Пиаскледин 300 не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие

Использование с другими лекарственными препаратами не отмечено.

Условия хранения

Препарат подлежит хранить в защищенном от света, недоступном для малышей месте при температуре от 15° до 25°С. Период годности - 3 года.