

# Траумель С / Traumeel® S

Таблетки - регистрационное удостоверение № 011686/01-2000 от 14.02.2000

Мазь - регистрационное удостоверение № 011686/02-2000 от 14.02.2000

Капли - регистрационное удостоверение № 011686/03-2000 от 14.02.2000

Р-р для инъекций - регистрационное удостоверение № 011686/04-2001 от 21.05.2001

## Форма выпуска:

капли д/приема внутрь 30 мл

таблетки сублингв. 0,3 г/50 шт.

мазь 50 г

р-р д/инъекций 2,2 мл/ амп. 5, 100 шт.

## Состав:

Капли: 100 мл содержат: Arnica D2, Calendula D2, Hamamelis D2, Millefolium D3 по 5 мл, Atropa belladonna D4 25 мл, Aconitum D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulphuris D8 по 10 мл, Chamomilla recutita D3, Symphytum D8 по 8 мл, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 2 мл, Hypericum D2 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Таблетки: 1 таблетка содержит: Arnica D2, Calendula D2, Hamamelis D2, Millefolium D3 по 15 мг, Atropa belladonna D4 75 мг, Aconitum D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulphuris D8 по 30 мг, Chamomilla recutita D3, Symphytum D8 по 24 мг, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpureae D2 по 6 мг, Hypericum D2 3 мг.

Раствор для инъекций: 1 ампула (2,2 мл) содержит: Arnica D2, Calendula D2, Millefolium D3, Atropa belladonna D2, Chamomilla recutita D3, Symphytum D6 по 2,2 мкл, Aconitum D2 1,32 мкл, Bellis perennis D2 1,1 мкл, Hypericum D2 0,66 мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 0,55 мкл, Hamamelis D1 0,22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D2 2,2 мкл.

Мазь: 100 г содержат: Arnica D3 1,5 г, Calendula, Hamamelis по 0,45 г, Millefolium, Hypericum D6 по 0,09 г, Atropa belladonna D1, Aconitum D1 по 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 г, Hepar sulphuris D6 0,025 г, Symphytum D4, Bellis perennis по 0,1 г, Chamomilla recutita, Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea по 0,15 г. Основа: гидрофильная мазь Salbe DAB 10, консервированная этанолом 12,5%.

## Фармакологическое действие:

Противовоспалительное, антиэкссудативное, иммуностимулирующее, регенерирующее, обезболивающее, антигеморрагическое, вентонизирующее.

## Показания:

Вывихи, растяжения, переломы костей, отек мягких тканей после операций и травм, воспалительные процессы различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит).

**Способ применения и дозы:**

Сублингвально, обычно по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Раствор для инъекций: в/м (при рубцах), околосуставно по 2,2-4,4 мл 1-3 раза в неделю, в острых случаях – ежедневно.

Местно: втирают мазь 2-5 раз в сутки; возможно наложение повязки, компресса.

Внутрь: по 10 капель 3 раза в сутки.

**Побочные действия:**

Артралгия (при внутрисуставных инъекциях), гиперсаливация и аллергические реакции, требующие отмены препарата.

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность к Arpica (мазь) и сложноцветным (раствор для инъекций). В случае инъекций не применять при туберкулезе, лейкозах, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекциях и других аутоиммунных заболеваниях.

Меры предосторожности:

Не следует использовать мазь на больших участках тела.

**Сочетанное применение с другими препаратами:**

Без особенностей.

**Особые указания:**

Необходимо исключить применение мази на больших участках тела. Эффективность терапии повышается при одновременном применении нескольких лекарственных форм препарата. При заболеваниях суставов рекомендуется сочетанная терапия с препаратом Цель Т.