

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ТРОКСЕВАЗИН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ТРОКСЕВАЗИН®

Международное непатентованное название: троксерутин

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Состав:

Активное вещество: в 1 г геля содержится 20 мг троксерутина

Вспомогательные вещества: карбомер 6 мг, троламин (триэтаноламин) 7 мг, динатрия эдетат 0,5 мг, бензалкония хлорид 1 мг, вода очищенная 965,5 мг.

Описание: Гель от желтого до светло-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Венотонизирующее и венопротекторное средство.

Код АТХ C05CA04.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Троксевазин® представляет собой флавоноид (производное рутина). Обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови.

Уменьшает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности.

Фармакокинетика:

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

Показания к применению:

- Варикозная болезнь;
- Хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- Тромбофлебит;
- Перифлебит;
- Варикозный дерматит;
- Боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату. Нарушение целостности кожных покровов.

Беременность и период лактации: Данных относительно нежелательного воздействия на плод и

новорожденного при использовании препарата нет.

Способ применения и дозы:

Наружно!

Гель наносят на область поражения 2 раза в сутки утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени.

Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин[®] для усиления воздействия.

Если симптомы течения заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, следует обратиться к врачу, который назначит дальнейшее лечение и определит длительность курса терапии.

Побочное действие:

В редких случаях наблюдаются аллергические кожные реакции - крапивница, экзема, дерматит.

Передозировка:

Ввиду наружного способа применения и большой терапевтической широты препарата опасности возникновения передозировки нет. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин[®] отсутствуют.

Меры предосторожности при применении:

Гель наносят только на неповрежденную поверхность.

Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки!

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Вождение автомобиля и работа с механизмами

Троксевазин[®] гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с движущимися механизмами.

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 2%.

По 40 г в алюминиевую трубу с внутренним лаковым покрытием, с алюминиевой мембраной или в ламинатную (пластиковую) трубу с алюминиевой мембраной. Каждую трубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

Для алюминиевой тубы - 5 лет.

Для ламинатной (пластиковой) тубы - 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

“БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН” АД Болгария, г. Троян, ул. Крайречна 1

Адрес представительства: ООО „Актавис” 127018, г. Москва, ул. Сушевский вал, д. 18