

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АКТОВЕГИН®

Регистрационный номер: П N014635/05-140308

Торговое название препарата: АКТОВЕГИН®

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав

100 г мази содержат:

активное вещество: компоненты крови - депротенинизированный гемодериват крови телят: 5 мл (соотв. 0,2 г сухой массы);

вспомогательные вещества: парафин белый, цетиловый спирт, холестерин, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, вода очищенная.

Описание: однородная мазь белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: регенерации тканей стимулятор.

Код АТХ: D11AX

Фармакологическое действие

АКТОВЕГИН® - антигипоксant, активирует метаболизм глюкозы и кислорода.

АКТОВЕГИН® вызывает увеличение клеточного энергетического метаболизма. Его активность подтверждается увеличением потребления и повышением утилизации глюкозы и кислорода клетками. Эти два эффекта сопряжены, они вызывают увеличение метаболизма АТФ и, следовательно, повышают энергетический обмен. Результатом этого является стимулирование и ускорение процесса заживления, характеризующегося повышенным потреблением энергии.

Показания

- Раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, такие, как: солнечные, термические, химические ожоги в острой стадии, порезы кожи, ссадины, царапины, трещины. С целью улучшения регенерации ткани после ожогов, в том числе после ожога кипящей жидкостью или паром.
- Язвы варикозного происхождения или другие мокнущие язвы.
- Для профилактики и лечения пролежней.
- Для профилактики и лечения реакций со стороны кожи и слизистых, обусловленных воздействием радиации.

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату АКТОВЕГИН® или аналогичным препаратам.

Применение при беременности и лактации допускается.

Способ применения и дозы

Наружно.

Курс лечения составляет не менее 12 дней и продолжается на протяжении всего периода активной регенерации. Кратность применения - не менее 2 раз в день.

Язвы, раны и воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек: как правило, в качестве последнего звена в поэтапном «трехступенчатом лечении» с применением АКТОВЕГИНа® 20% в форме геля и 5% крема, АКТОВЕГИН® 5% мазь наносится тонким слоем,

Для профилактики пролежней мазь втирают в кожу в зонах повышенного риска.

С целью профилактики возникновения радиационных поражений АКТОВЕГИН® 5% мазь наносят тонким слоем непосредственно после радиационной терапии и в интервалах между сеансами.

В случае отсутствия или недостаточности эффекта от применения АКТОВЕГИНа® 5% в форме мази, следует обратиться к врачу.

Побочное действие

Обычно препарат переносится хорошо.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции гиперчувствительности, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время неизвестно.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5%.

По 20 г, 30 г, 50 г, 100 г в алюминиевые тубы с контролем первого вскрытия и пластмассовой крышкой. 1 туба с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

При температуре не выше 25 °С.

Условия хранения

При температуре не

Хранить в месте, недоступном для детей!

Отпуск из аптек: без рецепта.

Производитель

"Никомед Австрия ГмбХ", Австрия

Ст. Петер Штрассе 25, А-4020 Линц, Австрия

"Nycomed Austria GmbH", Austria

St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz, Austria

Претензии потребителей направлять по адресу: «Никомед»

119049 г, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр. 2.