

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

## **ГЛИКОДИН**

**Регистрационный номер:** P 012064/01

**Торговое название препарата:** Гликодин

**Лекарственная форма:** сироп

### **Состав**

5 мл сиропа содержит:

*активные вещества* - декстрометорфан гидробромид 10 мг, терпингидрат 10 мг, левоментол 3,75 мг.

*Вспомогательные вещества:* сахароза, метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, лимонной кислоты моногидрат, пропилен гликоль, глицерол, натрия сахаринат, карамель, алем (ВВА), кремний очищенный, вода дистиллированная.

### **Описание.**

Коричневая жидкость без посторонних включений с характерным запахом и вкусом.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство).

**Код АТХ** [R05FB02].

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика.**

Декстрометорфан обладает противокашлевым действием. Угнетая возбудимость кашлевого центра, подавляет кашель любого происхождения. Не оказывает наркотического, болеутоляющего и снотворного действия. Начало действия - через 10-30 мин после приема, продолжительность - в течение 5-6 ч у взрослых и до 6-9 ч - у детей.

Терпингидрат обладает отхаркивающим действием; повышает секреторную функцию эпителиальных желез дыхательных путей, увеличивает объем секрета и снижает вязкость выделяемого секрета.

Левоментол обладает умеренным спазмолитическим действием. Облегчает состояние при проявлении симптомов острого ринита, фарингита, ларингита и бронхита.

#### **Фармакокинетика.**

После приема внутрь декстрометорфан полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте, метаболизируется в печени. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 часа. До 45% декстрометорфана может выводиться с мочой.

Терпингидрат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта после приема внутрь. Препарат циркулирует в крови в неизменном виде и выводится через дыхательные пути, с мочой и потом, которым он придает специфический запах. Часть препарата подвергается в организме окислению и выводится с мочой в виде фенолов вместе с глюкуроновой кислотой.

### **Показания к применению**

Острые и хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся сухим раздражающим кашлем.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, бронхиальная астма, беременность, период лактации, детский возраст до 4 лет. С осторожностью - нарушения функции печени.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослые: 1 чайная ложка (5 мл) 3-4 раза в день. Дети: - от 4 до 7 лет - 1/4 чайной ложки 3-4 раза в день; - от 7 до 12 лет - 1/2 чайной ложки 3-4 раза в день.

### **Побочное действие**

Сонливость, тошнота, головокружение, зуд, крапивница.

### **Передозировка**

Симптомы: возбуждение, головокружение, угнетение дыхания, снижение артериального давления, тахикардия, диспепсические расстройства.

Лечение: искусственная вентиляция легких, симптоматическое лечение.

Имеется специфический антидот Налоксон, который может применяться при передозировке в 100 и более раз.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Синергическое взаимодействие с наркотическими противокашлевыми препаратами и другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС. Не исключается возможность взаимодействия декстрометорфана с ингибиторами моноаминоксидазы. Поэтому у пациентов, принимающих ингибиторы моноаминоксидазы, Гликодин сироп от кашля желательно исключить.

### **Особые указания**

Лицам, применяющим препарат, следует воздержаться от управления автомобилем и работы с опасными механизмами.

### **Форма выпуска**

По 50 мл; 100 мл в круглые флаконы темного стекла с алюминиевой навинчивающейся крышкой. Каждый флакон вместе с мерной пластмассовой ложечкой и инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не следует использовать лекарственное средство по истечении указанного на упаковке срока годности!

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

**Производитель:** "Алембик Лимитед", Алембик Роуд, Вадодара-390 003, Гуджарат, Индия.

**Представительство фирмы "Алембик Лимитед":**

117049 Москва, ул.Донская 18/7 стр.1 оф.3.