

## ИНСТРУКЦИЯ

*по медицинскому применению препарата*

## ИНДОВАЗИН

**Торговое наименование:** Индовазин (Indovasin)

**Международное наименование:** Индометацин+Троксерутин (Indometacin+Troxerutin)

**Страна-производитель:** Болгария

**Фирма-производитель:** Balkanpharma - Troyan AD

**Формы выпуска:** гель для наружного применения (тубы алюминиевые) 45 г

**Состав:** индометацин 3%, троксерутин 2%

**Фармакологическая группа:** противовоспалительное средство для местного применения

**Фармакологическая группа по АТК:** M02AA23 Индометацин

**Фармакологическое действие:** анальгезирующее; противовоспалительное местное

**Номер регистрации препарата:** П №012746/01

**Даты регистрации, перерегистрации:** 25.09.2003

**Коды ТН ВЭД РФ:** 3004 90 190 9

**Номер фармстатьи:** НД 42-8347-03

**Срок годности:** 2 года

**Фармакодинамика:** Индометацин подавляет синтез P<sub>g</sub>, снижает уровень медиаторов, вызывающих воспалительный процесс. Троксевазин уменьшает проницаемость капилляров и улучшает микроциркуляцию в месте применения.

**Показания:** Бурсит, тендовагинит, синовит, варикозное расширение вен, геморрой, гематома травматического генеза, состояние после длительной иммобилизации.

**Режим дозирования:** Наружно. Выжать из тубика 1-2 см геля и нанести легкими втирающими движениями на пораженные участки 2-3 раза в день.

**Побочные действия:** Аллергические реакции (кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, кожный зуд).

**Противопоказания:** Гиперчувствительность, лейкопения, геморрагический диатез.

**Отпуск из аптек:** Отпускают без рецепта.