

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛИНКАС® (LINKUS)

Торговое название препарата: ЛИНКАС

Лекарственная форма: сироп

Состав

10 мл сиропа содержат:

Активные компоненты: Адхатоды сосудистой листьев экстракт сухой (*Adhatoda vasica* Ness.) 600 мг, Солодки голой корней экстракт сухой (*Glycyrrhiza glabra* L.) 75 мг, Перца длинного плодов и корней экстракт сухой (*Piper longum* L.) 100 мг, Фиалки душистой цветков экстракт сухой (*Viola odorata* L.) 25 мг, Иссопа лекарственного листьев экстракт сухой (*Hyssopus officinalis* L.) 50 мг, Альпинии галанга корней и корневищ экстракт сухой (*Alpinia galanga* (L.) Willd) 50 мг, Кордии широколистной плодов экстракт сухой (*Cordia latifolia*) 100 мг, Алтея лекарственного цветков экстракт сухой (*Altea officinalis* L.) 100 мг, Зизифуса настоящего плодов экстракт сухой (*Zizyphus tujuba* Mill.) 100 мг, Оносмы прицветковой листьев и цветков экстракт сухой (*Onosma bracteatum* Wall.) 100 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная безводная, глицерин, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

Описание

Сироп коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Фармакологические свойства

Комплексный аюрведический препарат на основе лекарственного растительного сырья. Снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне острых респираторных заболеваний, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита «курильщиков» и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью: сахарный диабет.

Применение при беременности и лактации

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь; дети от 6-ти месяцев до 3-х лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в день;

от 3 лет до 8 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день;

от 8 до 18 лет - по 1 чайной ложке 4 раза в день;

взрослые - по 2 чайные ложки 3-4 раза в день.

Длительность применения препарата 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Особые указания

Сироп содержит сахарозу (70%), что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также находящимся на гипокалорийной диете.

Форма выпуска

По 90 мл сиропа в стеклянный флакон коричневого цвета, который вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель:

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, 30/28, Промышленная зона Коранги, Карачи. Пакистан

Адрес представительства: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 8, стр. 3