

Инструкция по медицинскому применению препарата

ЛИОТОН® 1000

Регистрационный номер: П N012107/01 от 14.07.2006

Торговое патентованное название: Лиотон® 1000

Международное непатентованное название (МНН): гепарин натрий

Лекарственная форма: гель для наружного применения 1000 МЕ/г

Состав: В 1 г геля содержится:

Действующее вещество: гепарина натриевая соль 1000МЕ

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, карбомер 940, спирт этиловый 96%, неролиевое масло, лавандовое масло, триэтаноламин, вода очищенная.

Описание:

Бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный гель вязкой консистенции.

Фармакотерапевтическая группа: антикоагулянт прямой для местного применения.

КОД АТХ: C05BA03

Фармакологические свойства

Оказывает умеренное противовоспалительное и противоотечное действие, препятствует образованию тромбов (образует комплекс с антитромбином III и нарушает переход протромбина в тромбин, угнетает активность тромбина, уменьшает агрегацию тромбоцитов), ослабляет активность гиалуронидазы, повышает фибринолитические свойства крови, оказывает гипополипидемическое действие.

Фармакокинетика

Максимальная концентрация в крови достигается через 8ч после аппликации и возвращается к нормальному уровню через 12-24ч. Выводится в основном с мочой.

Показания к применению

- Тромбофлебит поверхностных вен;
- локализованные инфильтраты и отеки мягких тканей;
- травмы сухожилий и суставов, ушибы мягких тканей и суставов;
- подкожные гематомы.

Противопоказания

Известная повышенная чувствительность к компонентам геля, язвенно-некротические изменения кожи в местах предполагаемого нанесения геля, травматическое нарушение целостности кожных покровов, пониженная свертываемость крови, тромбоцитопения.

Способ применения и дозы

Наружно, гель наносят тонким слоем на область поражения из расчета 3 -5 см геля на участок кожи диаметром 3- 5 см и осторожно втирают мазь в кожу 1-3 раза в день.

Длительность применения в среднем от 3 до 7 дней (до исчезновения воспалительных явлений).

Сроки лечения определяются врачом.

Побочные действия

Кожные аллергические реакции, гиперемия кожи.

Передозировка

Передозировка мало вероятна в связи с низкой всасываемостью компонентов геля.

Особые указания

Не рекомендуется применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, слизистых оболочках и при наличии местных гнойных процессов.

Использовать с особой осторожностью при повышенной проницаемости сосудов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется смешивать с другими средствами для наружного применения, не назначают местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами, антигистаминными средствами.

Форма выпуска

Гель для наружного применения 1000 МЕ/г.

По 30, 50 или 100 г препарата в тубы, изготовленные из мягкого алюминия, покрытые изнутри эпоксидной смолой с навинчивающимся колпачком-перфоратором (полиэтилен/полипропилен).

По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

5 лет.

По истечении срока годности не применять.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Фирма - производитель:

"А.Менарини Индустриз Фармачеутике Риунитэ С.р.Л произведено "А.Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.Л.", Италия

Фирма - дистрибьютор: Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ, Германия

Берлин-Хеми АГ

Темпельхофер Вег 83

12347 Берлин, Германия

Адрес для предъявления претензий:

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ "Башня на Набережной", Блок Б