

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

### **ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ®**

Торговое название

Оциллококцинум®

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические

Состав (на одну дозу):

Активные компоненты:

Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum

(анас барбаризелиум, гепатик эт кордис экстрактум) 200 К 0,01 мл

Вспомогательные компоненты:

сахарозы, лактозы - до 1000 мг

### **Описание**

Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в воде.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство.

### **Показания к применению**

Грипп и простудные заболевания.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы**

Положить под язык содержимое контейнера-дозы и держать до полного растворения.

Для детей: растворить содержимое дозы в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской.

Принимать препарат за 15 мин до приема пищи или час спустя.

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Для профилактики: принимать по 1 дозе в неделю в период распространения ОРВИ.

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем повторить при необходимости 2-3 раза с интервалом в 6 часов.

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней. Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться к врачу.

### **Побочное действие**

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

### **Особые указания**

Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение – с первых же симптомов заболевания.

Применение при беременности и в период лактации

Препарат применяется по назначению врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами  
Не влияет.

### **Форма выпуска**

Гранулы гомеопатические.

Тип 1.

По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого полипропилена.

По 1, 3 или 6 туб помещают в пластмассовый поддон, который вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Тип 2.

По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена.

По 3 тубы в блистер из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной фольгой. По 1, 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

### **КАК ОТКРЫТЬ УПАКОВКУ**

1-Вытащить контейнер с 3 дозами из коробки 2-Нажать на ячейку с прозрачной стороны, чтобы нарушить защиту 3-Вытащить дозу

**Производитель**

Лаборатория БУАРОН, 20, рю де ля Либерасьон,  
69110 Сент-Фуа-ле-Лион, Франция.